



بررسی وضعیت سندروم متابولیک در رانندگان برون شهری کاشان

دکتر حمیدرضا صابری^۱، کریم پرستویی^۲، دکتر سید علیرضا مروجی^۳

^۱ استادیار طب کار، گروه پزشکی اجتماعی و گروه تخصصی مرکز تحقیقات تروما، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

^۲ کارشناس ارشد تغذیه، گروه بیوشیمی و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

^۳ استادیار پزشکی اجتماعی، گروه پزشکی اجتماعی و گروه تخصصی مرکز تحقیقات تروما، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

چکیده

زمینه: به نظر می‌رسد که رانندگان برون شهری با توجه به شرایط کاری خود بیشتر در معرض سندروم متابولیک و عوارض ناشی از آن هستند که علاوه بر آسیب به خود راننده، به علت نقش و مسئولیت این افراد، سلامتی دیگران نیز می‌تواند به خطر افتاد؛ که این مطالعه با نیل به این هدف انجام شد.

مواد و روش‌ها: در یک مطالعه مقطعی ۴۲۹ نفر راننده برون شهری کاشان از لحاظ سندروم متابولیک بر اساس وجود سه یا بیشتر از معیارهای ذیل شامل: تری‌گلیسرید ≤ ۱۵۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر، فشارخون $\leq ۱۳۰/۸۵$ میلی‌متر جیوه، قندخون ناشتا ≤ ۱۱۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر، دورکمر ≤ ۱۰۲ سانتی‌متر و ≤ ۴۰ HDL کلسترول میلی‌گرم در دسی‌لیتر (معیارهای ATPIII) مورد بررسی قرار گرفتند.

تست‌های آماری تست‌های آماری تی تست، مجذور کای و آزمون همبستگی پیرسون برای تجزیه و تحلیل استفاده گردید.

یافته‌ها: شیوع سندروم متابولیک در رانندگان $۳۵/۹$ درصد بود. که بیشترین محدوده سنی $۳۰-۳۹$ سال ($۳۱/۹$ درصد) بود. $۴۲/۹$ درصد رانندگان به فشار خون و ۷ درصد آن‌ها به دیابت مبتلا بودند. ۴۱ درصد دارای شاخص توده بدنی در محدوده $۲۵-۳۰$ (اضافه وزن) بوده و $۲۳/۱$ درصد چاق محسوب می‌شدند. در بین اجزاء سندروم متابولیک، تری‌گلیسرید بالا ($۵۳/۴$ درصد) و HDL کلسترول پائین ($۴۸/۷$ درصد) بیشتر از بقیه دیده شدند. بین دیابت و فشارخون و همچنین فشارخون و مصرف سیگار ارتباط معنی‌دار وجود داشت ($p < 0.006$).

نتیجه‌گیری: براساس این مطالعه شیوع سندروم متابولیک و سایر عوامل مستعد کننده بیماری‌های کرونری قلب در بین رانندگان مورد مطالعه بسیار بالاست و فراتر از آمارهای موجود است. در نهایت توصیه می‌شود با آموزش این افراد و وضع قوانین مربوط و بررسی عوارض سندروم متابولیک در این افراد و درمان آن‌ها در حفظ و ارتقاء سلامتی این افراد و جامعه کوشش گردد.

واژگان کلیدی: رانندگان، سندروم متابولیک، دیابت، شاخص توده بدنی، فشار خون، چاقی

دریافت مقاله: ۸۷/۱۲/۵ - پذیرش مقاله: ۸۸/۲/۲۶

* کاشان، بلوار راوند، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پزشکی، گروه پزشکی اجتماعی. تلفن: ۰۳۶۱۵۵۵۰۱۱۱

مقدمه

درصد بالا نمی‌برد. ریسک ده ساله مردان دارای این سندرم بین ۱۰-۲۰ درصد می‌باشد، ولی زنان وقایع کرونری نسبتاً کمتری را در طول هشت سال پیگیری فرامینگھام داشتند و ریسک ده ساله آن‌ها بیشتر از ۱۰ درصد نمی‌باشد (۶). علت زمینه‌ای سندرم متابولیک ناشناخته است. اگرچه مقاومت به انسولین و تجمع چربی احشایی به عنوان پیش زمینه‌های آن پیشنهاد می‌گردد. اخیراً تعدادی مقالات مروری درباره روش‌های تشخیص سندرم متابولیک منتشر شده‌اند (۷ و ۸). به علت فقدان معیارهای یکسان برای تعریف این سندرم، شیوع سندرم متابولیک در مطالعات گوناگون بسیار متفاوت بوده است (۹ و ۱۰). شیوع این سندرم در ایالات متحده به نحو فزاینده‌ای بالا رفته است و بر طبق یافته‌های سومین بررسی تغذیه و بهداشت ملی^۱ آمریکا، شیوع سندرم متابولیک مطابق با تعریف سومین گزارش پانل درمان بزرگسالان (ATPIII) مربوط به برنامه ملی آموزشی کلسترول ۲۱/۸ درصد بوده است. علی‌رغم فقدان داده‌های دقیق مرگ و میر، شواهد کافی مبنی بر اهمیت بیماری‌های قلبی عروقی در ایران وجود دارد (۱۲). در حالی که در بسیاری از کشورهای پیش‌رفته، مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی-عروقی در ۲۰ سال قبل کاهش یافته است (۱۳ و ۱۴). مطالعات نشان داده‌اند که ۲۰-۴۵ درصد مرگ و میر در ایران ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی است (۱۵). رانندگان با توجه به شرایط کاری خود بیشتر در معرض بیماری‌ها، خصوصاً اجزای تشکیل‌دهنده سندرم متابولیک و عوارض ناشی از آن هستند. اگرچه این بیماری‌ها می‌توانند به شخص راننده آسیب وارد نمایند ولی به علت نقش و مسئولیت این افراد، سلامتی دیگر

سندرم متابولیک یا سندرم X، مجموعه‌ای از اختلالات متابولیک و غیرمتابولیک مانند: بالا بودن قندخون ناشتا، افزایش تری گلیسرید خون، پرفشاری خون، پایین بودن HDL کلسترول و چاقی شکمی می‌باشد. افرادی که سه اختلال یا بیشتر را داشته باشند، به عنوان فرد مبتلا به سندرم متابولیک تشخیص داده می‌شوند (۱ و ۲). این سندرم خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی، دیابت، دیس‌لیپیدمی، سکته مغزی، استئوآرتیت، برخی سرطان‌ها و مرگ و میر را افزایش می‌دهد، هزینه‌های سنگینی را به سیستم بهداشتی درمانی تحمل می‌کند و به طور کلی کیفیت زندگی را کاهش می‌دهد (۳). مطالعات نشان داده‌اند که یک همزمانی در بروز عوامل متابولیک در اشخاص مختلف وجود دارد و وجود مجموعه این عوامل مضترم از هر یک به تنها است (۴). سندرم متابولیک ۲۵ درصد از جمعیت بالغین آمریکایی و ۹/۲ درصد از نوجوانان آمریکایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد (۵). شیوع سندرم متابولیک در گروه‌های نژادی ساکن در آسیا کاملاً مشخص نیست؛ در صورتی که آسیا منطقه‌ای است که شیوع دیابت و بیماری‌های قلبی عروقی در آن در آینده‌ای نزدیک، احتمالاً بیشترین افزایش را خواهد داشت (۶). شیوع این سندرم در مغولستان ۱۹ درصد، در عمان ۲۱ درصد، در فلسطین ۱۷ درصد، در مالزی ۲۴/۲ درصد، در تایوان ۲۱/۱۶ درصد، در سنگاپور ۱۲/۲ درصد، در ژاپن ۱۲ درصد، در چین ۱۴/۸ درصد، در هند ۲۸/۸ درصد در مردان کره‌ای ۲۸/۶ درصد و در زنان کره‌ای ۲۷/۸ درصد می‌باشد (۱ و ۳-۶). در غیاب دیابت، سندرم متابولیک عموماً ریسک ده ساله بیماری کرونری قلب را بیشتر از ۲۰

^۱ Third National Health and Nutrition Examination Survey

نواری در فوچانی ترین قسمت ستیغ ایلیاک اندازه‌گیری شد. برای اندازه‌گیری فشارخون از بازو بند متناسب با دور بازو و فشارسنج جیوه‌ای استفاده شد؛ فشارخون افراد دو بار به فاصله حداقل پنج دقیقه در وضعیت نشسته از دست راست و پس از حداقل پنج دقیقه استراحت گرفته شد و پروفشاری خون در حد خفیف در فاصله $Bp=140-159/90-99$ و متوسط در حد $Bp=160-180/100-119$ تعريف شد. خون‌گیری از کلیه شرکت‌کنندگان پس از ۱۲ ساعت ناشتا بودن در طول شب، انجام گرفت. به شاخص توده بدنی کمتر از ۱۸ کم وزن؛ شاخص توده بدنی بین ۱۸ تا ۲۴ وزن نرمال و شاخص توده بدنی بین ۳۰-۲۵ دارای اضافه وزن و بالاتر از ۳۰ چاق اطلاق شد. معیار دیابت قند خون ناشتای مساوی یا بالاتر از ۱۲۶ میلی‌گرم در دسی‌لیتر در SPSS نظر گرفته شد. آنالیز آماری داده‌ها با استفاده از SPSS Inc., Chicago, IL, USA نسخه ۱۳ گرفت؛ همچنین از تست‌های آماری تی تست، مجذور کای و آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید.

یافته‌ها

در این مطالعه ۴۲۹ نفر راننده مرد مورد مطالعه قرار گرفتند که بیشتر در محدوده سنی ۳۰-۳۹ سال، ۱۳۷ نفر (۳۳درصد)، قرار داشتند و راننده‌اند بالای ۶۰ سال کمترین تعداد، ۱۲ نفر (۲/۸ درصد) را داشتند. جدول شماره ۱ توزیع فراوانی سندرم متابولیک را در کل راننده‌اند و در راننده‌اند دارای سندرم متابولیک نشان می‌دهد. در کل بین راننده‌اند مورد بررسی ۱۸۴ نفر به پروفشاری خون مبتلا بودند، که در این بین ۹۰ نفر دارای پروفشاری خون در سطح خفیف و ۹۴ نفر در سطح متوسط بودند. از این میان، در هیچ‌کدام از افراد پروفشاری خون شدید مشاهده نشد.

افراد نیز می‌توانند به خطر افتاد. در مطالعات انجام شده استرس‌های شغلی، عدم تحرک، شیفت کاری، تغییر در عادات غذایی، از جمله موارد عمدۀ ایجاد خطرات سلامتی در راننده‌اند است (۱۶ و ۱۷).

با توجه به در معرض خطر بودن راننده‌اند و جایگاه مهم آنان برای سلامتی سایر افراد جامعه و بنابر عدم وجود اطلاعات در این مورد در سطح کشور، مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت این سندرم در جمعیت راننده‌اند بروند شهری کاشان انجام شد.

مواد و روش کار

در یک مطالعه مقطعی که بر روی ۴۲۹ نفر از کلیه راننده‌اند بروند شهری کاشان که جهت دریافت کارت سلامت مراجعه کرده بودند انجام گردید. داده‌های مورد نیاز مطالعه در قالب جمع‌آوری اطلاعات به صورت پرسشنامه، به دست آمد. پرسشنامه شامل اطلاعات دموگرافیک و آنتروپومتریک (قد و وزن و دور شکم)، وجود ریسک فاکتورهای قلبی (فشار خون بالا، دیابت، دیس‌لیپیدمی، سیگار، تغذیه، فعالیت بدنی و استرس) بود. همچنین آزمایشات قند خون ناشتا، تری‌گلیسرید، HDL کلسترول و کلسترول تام انجام شد و سندرم متابولیک با وجود سه معیار یا بیشتر از پنج معیار ATP III تشخیص داده شد. این معیارها شامل: چاقی شکمی (دور کمر بیشتر از ۱۰۲ سانتی‌متر در راننده‌ها): تری‌گلیسرید بیشتر از ۱۵۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر؛ فشار خون بیشتر از ۱۳۰/۸۵ میلی‌متر جیوه؛ قندخون ناشتا بیشتر از ۱۱۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر و سطح سرمی HDL کلسترول کمتر از ۴۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر می‌باشد. وزن افراد مراجعه کننده با ترازو و بر حسب کیلو گرم و قد با متر بر حسب سانتی‌متر اندازه‌گیری شد. دور کمر افراد مورد بررسی با متر

جدول ۱: توزیع فراوانی متغیرهای مورد بررسی در کل رانندگان و افراد مبتلا به سندرم متابولیک

سندرم متابولیک (n=۱۵۴)	کل رانندگان (n = ۴۲۹)	فشارخون سیستولیک ≥ 135 mmHg	فشارخون دیاستولیک ≥ 85 mmHg	فشار خون mmHg $\geq 140/90$	قند خون ناشتا mg/dl ≥ 110	تری گلیسرید mg/dl ≥ 150	HDL کلسترول mg/dl ≥ 40	دور کمر cm ≥ 102
۹۵ (۶۱/۷)	۱۶۰ (۳۷/۳)							
۵۹ (۳۸/۳)	۲۶۹ (۶۲/۷)	mmHg ≤ 135						
۷۶ (۴۹/۴)	۱۱۸ (۲۷/۵)		mmHg ≥ 85					
۷۸ (۵۰/۶)	۳۱۱ (۷۲/۵)		mmHg ≤ 85					
۱۰۹ (۷۰/۸)	۱۲۰ (۲۸/۰)	mmHg $140/90 \geq$						
۴۵ (۲۹/۲)	۳۰۹ (۷۲/۰)	mmHg $140/90 \leq$						
۵۶ (۳۶/۴)	۶۹ (۱۶/۱)		mg/dl $110 \geq$					
۹۸ (۶۳/۶)	۳۶۰ (۸۳/۹)		mg/dl $110 \leq$					
۱۳۸ (۸۹/۶)	۲۲۹ (۵۳/۴)	mg/dl $150 \geq$						
۱۶ (۱۰/۴)	۲۰۰ (۴۶/۶)	mg/dl $150 \leq$						
۱۲۰ (۷۷/۹)	۲۰۹ (۴۸/۷)		mg/dl $40 \geq$					
۳۴ (۲۲/۱)	۲۲۰ (۵۱/۳)		mg/dl $40 \leq$					
۹۶ (۶۳/۳)	۱۳۶ (۳۱/۷)			cm $102 \geq$				
۵۸ (۳۷/۷)	۲۹۳ (۶۸/۳)			cm $102 \leq$				

درصد به سندرم متابولیک مبتلا بودند. در رانندگان مورد بررسی، رابطه بین سطح سرمی قند خون ناشتا با فشار خون، معنی دار به دست آمد ($P=0.006$). بین فشارخون و استعمال سیگار نیز رابطه معنی داری به دست آمد ($P<0.001$). در رانندگان بین شاخص توده بدنی و فشارخون سیستولیک رابطه مثبت معنی دار آماری وجود دارد که این مطلب در مورد فشارخون دیاستولیک هم صدق می کند ($P=0.001$) ($P<0.001$) (جدول ۲ و ۳).

جدول ۲: توزیع فراوانی سندرم متابولیک بر حسب فشار خون و دیابت

متاپولیک	سندرم	دیابت	فشار خون
دارد	ندارد	دارد	ندارد
دارد	ندارد	۲۷۳ (۶۸/۴)	۲۳۲ (۷۵/۱)
دارد	دارد	۲ (۶/۷)	۲۷۳ (۳۵/۸)
دارد	دارد	۷۷ (۶۴/۲)	۷۷ (۲۴/۹)
دارد	دارد	۱۲۶ (۳۱/۶)	۲۸ (۹۳/۳)
جمع	جمع	۳۹۹ (۱۰۰)	۳۰۹ (۱۰۰)

*اعداد به صورت (درصد) تعداد می باشند.

تعداد ۳۰ نفر از رانندگان (۷ درصد) دیابت و ۱۷۶ نفر (۴۱ درصد) شاخص توده بدنی در محدوده اضافه وزن و ۹۹ نفر (۲۳/۱ درصد) شاخص توده بدنی در محدوده چاقی داشتند. در این بررسی ۱۵۴ نفر (۳۵/۹ درصد)، افراد دارای حداقل سه جزء و یا بیشتر از معیارهای ATP III برای تشخیص سندرم متابولیک بودند. در بین مبتلایان به سندرم متابولیک، شایع ترین جزء سطح سری تری گلیسرید بالا (۱۳۸ نفر معادل ۸۹/۶ درصد) و در درجه بعدی HDL کلسترول پایین تر از ۴۰ میلی گرم در دسی لیتر (۱۲۰ نفر معادل ۷۷/۹ درصد) بود. در بین ۳۰ نفر مبتلا به دیابت؛ ۲۸ نفر (۹۳/۳ درصد) و در بین افرادی که فشار خون بالای ۱۴۰/۹۰ میلی متر جیوه داشتند، ۷۷ نفر (۶۴/۲ درصد)؛ سندرم متابولیک دیده شد. در بین رانندگانی که شاخص توده بدنی در محدوده اضافه وزن داشتند، ۳۹/۸ درصد و افرادی که چاق بودند ۶۵/۷ درصد سندرم متابولیک دیده شد. در بین ۲۹/۸ نمونه که مصرف سیگار داشتند، ۴۲ نفر معادل ۱۴۱

فشار خون در این رانندگان با رانندگان کاشانی شاید به علت نوع جمعیت مورد مطالعه و تفاوت در معیارهای تشخیص پر فشاری خون و در اثر محیط و رژیم غذایی گوناگون باشد. از کل رانندگان؛ ۳۰ نفر (۷ درصد) مبتلا به دیابت بودند. در بررسی انجام شده در مازندران در سال ۱۳۸۲؛ ۳/۳ درصد کامیون داران شهر ساری سابقه ابتلا به دیابت را داشتند (۱۸). تفاوت شیوع دیابت در مطالعات ذکر شده ممکن است ناشی از گروههای سنی متفاوت، وجود جنسیت زن در برخی از مطالعات، رژیم غذایی متفاوت و همچنین معیارهای متفاوت تشخیص دیابت براساس سطح سرمی قندخون ناشتا باشد. تری‌گلیسیرید در ۲۲۹ نفر (۵۳/۴ درصد) با سطح سرمی بیشتر از ۱۵۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر وجود داشت. ۲۰۹ نفر که ۴۸۷ درصد کل افراد را شامل می‌شد؛ HDL کلسترول کمتر از ۴۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر بود. در بررسی که شیوع کلسترول بالا و تری‌گلیسیرید بالا را در بین رانندگان اتوبوس و کارگران حرفه‌ای در تایوان در سال ۱۹۹۸-۱۹۹۹ مقایسه کرد، شیوع کلسترول بالا و تری‌گلیسیرید بالا به ترتیب در رانندگان ۳۶/۴ و ۶۹/۴ درصد و در کارگران حرفه‌ای ۲۹/۹ درصد و ۳۰/۶ درصد گزارش گردیده است (۲۱) که این آمار با نتایج حاصل از مطالعه ما نیز همخوانی دارد. همچنین در بررسی شیوع سطوح پائین HDL کلسترول و سایر انواع اختلالات چربی در جمعیت ایرانی، شایع‌ترین اختلال چربی HDL کلسترول پائین در حد ۷۳ درصد و بعد از آن تری‌گلیسیرید سرمی بالا با ۴۰/۶ درصد ذکر شده است. در این بررسی افزایش کلسترول توتال (کلسترول بیشتر از ۲۰۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر) در حد ۳۵/۴ درصد و در ۹/۹ درصد جمعیت همراهی تری‌گلیسیرید بالا و HDL کلسترول پائین وجود داشت (۲۲). همان‌طور که مشاهده می‌شود در هر دو مطالعه شیوع تری‌گلیسیرید بالا

جدول ۳: توزیع فراوانی سندروم متابولیک بر حسب

شاخص توده بدنی

سندروم متابولیک	شاخص توده بدنی	شانس توده بدنی	لامار	نرمال	اضافه وزن	چاق
ندارد	۳۴	(۳۴/۳)	۱۰۶ (۶۰/۱)	۱۲۵ (۸۶/۸)	۱۰ (۱۰۰)	
دارد	۶۵	(۶۵/۷)	۷۰ (۳۹/۲)	۱۹ (۱۳/۲)	۰	
جمع	۹۹	(۹۹/۱)	۱۷۶ (۱۰۰)	۱۴۴ (۱۰۰)	۱۰ (۱۰۰)	

* اعداد به صورت (درصد) تعداد می‌باشد.

بحث

این مطالعه نشان داد که بیش از یک سوم رانندگان برون شهری (۳۵/۹ درصد) مبتلا به سندروم متابولیک بودند. اگرچه در مطالعات انجام شده به سندروم متابولیک در رانندگان اشاره‌ای نگردیده، ولی اجزاء آن مورد تحقیق قرار گرفته است. ۴۲/۹ درصد رانندگان مبتلا به پرفساری خون هستند. این یافته با مطالعه انجام شده توسط ترقی در سال ۸۲ در مازندران که از بین ۱۲۲ نفر کامیون داران، ۳۶/۹ درصد مبتلا به پر فشاری خون بودند (۱۸) و با نتایج ویتن (Witten) و کورلیتز (Korelitz) که در آن‌ها به ترتیب ۳۳ و ۳۵ درصد ذکر شده بود مطابقت داشت (۱۹ و ۲۰). در ایران بیش از ۱۵ درصد بالغین دچار پرفساری خون هستند (۱۸). براساس تحقیقات انجام شده در مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان؛ شیوع پرفساری خون در افراد بالای ۱۹ سال این شهر ۱۹ درصد گزارش شده است (۱۸). بالا بودن شیوع فشار خون در رانندگان نسبت به سایر مردم به احتمال زیاد ناشی از تحرک کم و نوع زندگی می‌باشد که لازم است توجه بیشتری به آن شود. بررسی ریسک فاكتورهای بیماری کرونری قلبی در بین رانندگان اتوبوس شهری و مقایسه آن با کارگران حرفه‌ای در سال ۱۹۹۸-۱۹۹۹ در تایوان شیوع پرفساری خون ۵۶ درصد در مقایسه با ۳۰/۶ درصد افراد ذکر شده است (۲۱)، که تفاوت شیوع

۱۰/۲ درصد بوده است. در این مطالعه، شیوع سندرم متابولیک براساس نوع کار، در کارگران حدود ۱۱/۸ درصد، کارمندان اداری ۹/۳ درصد و در بین مدیران ۷/۷ درصد بود، که این ممکن است به دلیل وجود ارتباط بین شیوع سندرم متابولیک و وظیفه اجتماعی افراد باشد (۲۵). در مطالعه انجام شده توسط شریفی و همکاران تحت عنوان شیوع سندرم متابولیک در جمعیت شهری غرب ایران؛ شیوع سندرم متابولیک ۲۳/۷ درصد بود (۲۶). این نتیجه با نتایج مطالعات قبلی انجام شده در ایران که شیوع سندرم متابولیک را در جمعیت عمومی ۳۲/۷، ۲۹/۹ و ۳۰/۱ درصد گزارش کرده بودند؛ هماهنگی دارد (۲۶)، ولی بیشتر از آمار بالغین بالای ۲۰ سال در آمریکا است که در سال ۲۰۰۳؛ حدود ۲۵ درصد بوده است. این می‌تواند به دلیل الگوی غذایی غلط و عدم تحرک بدنی مردم ایران باشد، بعضی از اختلافات موجود ممکن است بدلیل تنوع تعاریف موجود از این سندرم باشد. این تفاوت آمار در مطالعات ذکر شده را می‌توان به صنعتی شدن منطقه سکونت افراد، تغییرات شیوه زندگی، رژیم‌های غذایی ناسالم، کاهش فعالیت بدنی، چاقی مفرط و سیگار کشیدن نسبت داد.

براساس این مطالعه؛ شیوع سندرم متابولیک؛ در بین رانندگان مورد مطالعه نسبت به آمار قبلی موجود در جمعیت‌های عمومی و بعضی از مشاغل انجام شده، بالاتر است. علت ایجاد این حالت می‌تواند عدم تحرک اجباری، مصرف کالری زیاد، عدم آگاهی، عدم بررسی سلامتی توسط این افراد، استرس شغلی و شب‌کاری باشد. با توجه به شیوع هایپرلیپیدمی و اضافه وزن و چاقی در رانندگان نیاز است تا راهبردهای مداخله‌ای جهت تغییر وضعیت تغذیه‌ای و رفتاری در جامعه رانندگان صورت بگیرد.

و HDL کلسترول پائین، بالاست. تفاوت شیوع ممکن است ناشی از گروه‌های سنی متفاوت، وجود جنسیت زن در برخی از مطالعات، رژیم غذایی متفاوت، و همچنین معیارهای متفاوت تشخیصی باشد.

تعداد ۱۷۶ نفر (۴۱ درصد) و ۹۹ نفر (۲۳/۱ درصد) از رانندگان کاشانی به ترتیب جزء رده‌های اضافه وزن و چاق دسته‌بندی می‌شوند. در مطالعه‌ای که توسط بهشتی زواره در پژوهشکده علوم غدد درون ریزومتابولیسم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی انجام شده است، شیوع چاقی و اضافه وزن در جمعیت عمومی شهر تهران به ترتیب ۲۳/۷ و ۳۵/۷ درصد گزارش شده است (۲۷). در تحقیقی که در سال ۱۹۹۹ در عربستان توسط شاخطره (Shahhatreh) و همکاران انجام گرفته است، ۷۳/۲ درصد رانندگان چهار چاقی بودند (۲۳). در بررسی انجام شده در تایوان؛ در ۲۲۹۷ راننده شیوع چاقی در رانندگان اتوبوس ۹/۶ درصد و در کارگران؛ ۴/۶ درصد گزارش شد (۲۱). این اختلاف را می‌توان به خصوصیات سرشی مردم و اختلاف در رعایت غذایی آن‌ها مربوط دانست. در یک مطالعه صورت گرفته در بین رانندگان حرفه‌ای در مکریک در سال ۲۰۰۷؛ شیوع چاقی و افزایش وزن به ترتیب ۲۲/۵ و ۵۲/۷ درصد دیده شد که از جمعیت عمومی مکریک بالاتر بود (۲۴). که این نتایج با مطالعه ما هم خوان بود. همچنین علت شیوع اضافه وزن بالا در رانندگان ممکن است در ارتباط با استفاده از غذاهای چرب در رستوران‌ها و سبک زندگی کم تحرک و کمبود اطلاعات آنان از عوارض اضافه وزن باشد. ۳۵/۹ درصد رانندگان کاشانی براساس تعريف ATPIII به سندرم متابولیک مبتلا بودند. شیوع سندرم متابولیک در جمعیت کارگر اسپانیایی براساس معیارهای ATPIII،

References:

1. Shiwaku K, Nogi A, Kitajima K, et al. Prevalence of the metabolic syndrome using the modified ATP III definitions for workers in Japan, Korea and Mongolia. *J Occup Health.* 2005;47:126-35.
2. McNeill AM, Rosamond WD, Girman CJ, et al. The metabolic syndrome and 11-year risk of incident cardiovascular disease in the atherosclerosis risk in communities study. *Diabetes Care* 2005;28:385-90.
3. Jaber LA, Brown MB, Hammad A, et al. The prevalence of the metabolic syndrome among Arab Americans. *Diabetes Care* 2004; 27: 234-8.
4. Kim MH, Kim MK, Choi BY, et al. Prevalence of metabolic syndrome and its association with cardiovascular disease in korea. *J Korean Med Sci* 2004; 19: 195-201.
5. Tan CE, Ma S, Wai D, et al. Can we apply the National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel definition of the Metabolic syndrome to Asians. *Diabetes Care* 2004;27:1182-6.
6. Grundy SM, Brewer HB, Cleeman JI, et al. National Heart and Blood Institute, American Heart Assosiation. Definition of metabolic syndrome:report of the National Heart, Lung and Blood Institute/American Heart Association conference on scientific issues related to definition. *Circulation* 2004;109: 433-38.
7. Despres JP, Marette A. Relation of components of insulin resistance syndrome to coronary disease risk. *Curr Opin Lipidol* 1994;5:274-89.
8. Bonora E, Kiechl S, Willeit J, et al. Prevalence of insulin resistance in metabolic disorders:the Bruneck Study. *Diabetes* 1998; 47: 1643-9.
9. Rantala AO, Kauma H, Lilja M, et al. Prevalence of the metabolic syndrome in drug-treated hypertensive patients and control subjects. *J Intern Med* 1999; 245:163-74.
10. Ford ES, Giles WH, Dietz WH. Prevalence of the metabolic syndrome among US adults: findings from the third National Health and Nutrition Examination survey, *JAMA* 2002; 287; 356-9.
11. Ford ES, Giles WH. A comparison of the prevalence of the metabolic syndrome using two proposed definitions. *Diabetes Care* 2003;26: 575-81.
12. Ministry of health and medical education, deputy of research (Persian). *Health View.* Tehran: Tabalvor publication; 2003.
13. Beaglehole R, Stewart AW, Jackson R, et al. Declining rates of coronary heart disease in New Zealand and Australia, 1983-1993. *Am J Epidemiol* 1997;145:707-13.
14. World Health organaniztion. Eastern Mediterranean Regional office, Prevention and control of Cardiovascular Diseases, WHO-EMRO, Alexandria, Egypt, 1995, p.24.
15. Azizi F, Rahmani M, Emami H, et al. Tehran Lipid and Glucose Study: Rational and design, CVD prevention. 2000;3:242-7.
16. Ragland DR, Winkleby MA, Schwalbe J, et al. Prevalence of hypertension in bus drivers. *Int J Epidemiol* 1987; 16: 208-14.
17. Talbot E, Helmkamp J, Matthews K. Occupational noise exposure, noise-induced hearing loss, and epidemiology of high blood pressure. *Am J Epidemiol* 1985;121: 501-14.
18. Taraghi Z, Ilali E. Screening of Hypertension in truck drivers in mazandaran (Persian). *Hayat J* 2004;21: 63-9.
19. Whitten DL. Black boxes and the small carrier. *Transport Topics* 2000;1:13-14.
20. Korelitz JJ, Fernandez AA, Uyeda VJ, et al. Health habits and risk factors among truck drivers visiting a health booth during a trucker trade show. *Am J Health Promot* 1993; 8:117-23.
21. Wang PD, Lin RS. Coronary heart disease risk factors in urban bus drivers. *Public Health* 2001; 115:261-4.
22. Sharifi F, Mousavinasab SN, Soruri R, et al. Metabolic Syndrome and Related Disorders. *Mary Ann Liebert* 2008, 6: 187-95.
23. Shakhatreh FM , abclulboqi Kj. Obesity in drivers. *Saudi Med J* 2000;21 1:58-60.
24. Beheshti M, Sadeghi M, Sadeghian S, et al. Relationship between hypertension and Some related factors in 18-50 years peoples (Persian). The first Iranian congress of metabolic syndrome 2008 Jan 13-14 , Tabriz, Iran; 2008.
25. Siedlecka J. Risk of coronary heart disease in middle-aged male bus and tram drivers compared to men in other occupations: A prospective study. *Int J Epidemiol* 1991;20: 82-7.
26. Azabdaftari N, Ebrahimi - Mameghani M, Normohamadi M. The survey of metabolic syndrome criteria on firefighters in Tabriz city. The first Iranian congress of metabolic syndrome (Persian). 2008 Jan 13-14, Tabriz, Iran; 2008.