



ISMJ 2014;17(4): 716-722

دوماهنامه طب جنوب

پژوهشکده زیست-پزشکی خلیج فارس

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

سال هفدهم، شماره ۴، صفحه ۷۲۲ - ۷۱۶ (مهر و آبان ۱۳۹۳)

## بررسی اثر ضد میکروبی ترکیبات آمونیوم چهار ظرفیتی جدید روی باکتری‌ها و قارچ‌ها

مریم صدرنیا<sup>۱</sup>، ریما ژلداکوا<sup>۲</sup>، محمد ارجمندزادگان<sup>۳\*</sup>

<sup>۱</sup> گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور

<sup>۲</sup> گروه میکروبیولوژی، دانشکده زیست‌شناسی، دانشگاه دولتی بلاروس، مینسک، بلاروس

<sup>۳</sup> مرکز تحقیقات سل و عفونی کودکان و گروه ایمنی‌شناسی و میکروبی‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک

(دریافت مقاله: ۹۱/۸/۲۶ - پذیرش مقاله: ۹۱/۱۱/۱۲)

### چکیده


**زمینه:** ترکیبات آمونیوم چهار ظرفیتی (QACS) به‌عنوان مواد ضد میکروبی بسیار مؤثر در پزشکی و صنعت شناخته شده‌اند. بروز مقاومت فزاینده میکروب‌ها نسبت به این مواد، ضرورت تولید ترکیبات جدید با فعالیت گسترده‌تر و سمیت اندک را ایجاب می‌نماید. هدف این تحقیق ارزیابی اثر ضد میکروبی ترکیبات جدید که با ایجاد تغییر در ساختار و تغییر رادیکال‌ها ساخته شده‌اند روی باکتری‌ها، مخمرها و قارچ‌ها می‌باشد.

**مواد و روش‌ها:** ۱۶ نمک چهارتایی آمونیوم بی‌فنیل در حلال اتیل الکل یا استونیتریل تحت شماره‌های ۱ تا ۱۶ ساخته شدند. سپس با استفاده از روش استاندارد، حداقل غلظت ممانعت‌کنندگی از رشد (MIC) در محیط کشت غنی کننده گلوکز- نمکی محتوی عصاره مخمر و نیز نوترینت برات برای باکتری‌ها، پوتیتو آگار برای قارچ‌ها و نوترینت آگار و سابورودکستروز آگار برای مخمرها تعیین گردید. **یافته‌ها:** ترکیبات به شماره‌های ۲، ۷، ۸، ۹، ۱۲ و ۱۳ دارای بیشترین فعالیت ضد میکروبی (کمترین غلظت ممانعت‌کنندگی از رشد) بودند. علاوه بر این، غلظت ممانعت‌کننده از رشد در اکثر باکتری‌های مورد مطالعه غیر وابسته به ترکیب محیط کشت بود. نتایج به‌دست آمده از کشت مخمرها نشان داد که در صورت غنی بودن محیط رشدی، لازم است از غلظت بالاتر ترکیبات مورد مطالعه جهت مهار رشد استفاده شود. همچنین مشخص شد که مواد شماره ۹، ۱۲ و ۱۳ علاوه بر بالاترین اثر ضدباکتریایی، دارای بیشترین تأثیر ضد قارچی نیز می‌باشند.

**نتیجه‌گیری:** با مقایسه ساختار ترکیبات تولید شده و نتایج این تحقیق مشخص گردید که گروه قرار گرفته در محل رادیکال R3 بالاترین نقش را در ظهور اثر ضد میکروبی QuAC ها ایفا می‌کند بنابراین با جایگزین کردن گروه‌های مختلف در این محل، می‌توان مواد با حداکثر اثر ضد میکروبی و حداقل سمیت تولید نموده و با مقاومت میکروبی مقابله کرد.

**واژگان کلیدی:** ترکیبات آمونیوم چهار ظرفیتی، اثر ضد میکروبی، باکتری‌ها، قارچ‌ها، MIC

\* اراک، مرکز تحقیقات سل و عفونی کودکان، گروه میکروبی‌شناسی و ایمنی‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک



شکل ۱) ترکیبات چهارگانه آمونیوم، یون‌های چند اتمی با شارژ مثبت بوده و دارای ساختار  $NR_4^+$  می‌باشند. گروه R می‌تواند گروه آلکیل یا آریل باشد.

انتخاب رادیکال مناسب منجر به تولید QACS با تأثیر ضد میکروبی بسیار قوی‌تر خواهد شد. جهت مشخص کردن اثر ضد میکروبی ترکیبات از روش تعیین حداقل غلظت ممانعت کنندگی از رشد (MIC) استفاده می‌شود (۷ و ۸). MIC عبارت از حداقل غلظتی از ترکیب ضد میکروبی است که مانع رشد میکروارگانیسم‌ها می‌گردد (۳).

هدف این مطالعه، ایجاد تغییر در رادیکال‌های  $R_1$ ،  $R_2$ ،  $R_3$ ،  $R_4$  ترکیبات آمونیوم چهار ظرفیتی و تعیین اثر آن‌ها روی باکتری‌ها، قارچ‌ها و مخمرها جهت تولید QACS با اثر ضد میکروبی قوی‌تر می‌باشد.

### مواد و روش‌ها

۱- تولید نمک‌های چهارتایی آمونیومی بی‌فنیل از طریق جانشینی ۴ و ۴-دی کلرمتیل بی‌فنیل با N-N دی‌متیل آلکیل آمین یا N-N متیل اتانول آمین در حلال اتیل الکل یا استونیتریل همراه با جوشاندن به مدت ۸-۴ ساعت، ۱۶ ترکیب جدید به دست آمد که با اعداد ۱ تا ۱۶ نامگذاری گردیدند (نتایج چاپ نشده).

### ۲- بررسی اثر ضد میکروبی

بررسی اثر ضد میکروبی این ترکیبات روی تعدادی از گونه‌های باکتریایی، قارچی و مخمر کلکسیون میکروبی گروه میکروبیولوژی دانشکده زیست‌شناسی دانشگاه دولتی بلاروس انجام گرفت.

### مقدمه

ترکیبات چهارتایی آمونیوم (QACS)، نمک‌های حاوی اتم ازت دارای چهار رادیکال می‌باشند. این ترکیبات فعالیت وسیع ضد میکروبی داشته، بدون بو، بی‌رنگ، مقاوم به حرارت بالا و مؤثر در دامنه وسیعی از PH هستند. غلظت این ترکیبات در محلول‌ها، پایدار بوده و نسبت به وجود ترکیبات آلی مقاوم‌اند. QACS ها متوقف کننده رشد میکروب‌ها بوده و جهت ضد عفونی کردن سطوح و وسایل مورد استفاده قرار می‌گیرند. این مواد دارای اثر سمی کم و خصوصیات بسیار خوب شویندگی اند (۱-۳).

نمک‌های چهارتایی آمونیوم حاوی یک کاتیون چهار ظرفیتی  $R_1R_2R_3R_4N^+$  هستند.  $R_1$ ،  $R_2$ ،  $R_3$  و  $R_4$  می‌توانند رادیکال‌های الکیلی یا اریلی (متیل، اتیل، تولیل و غیره) باشند. مقاومت باکتری‌ها نسبت به ترکیبات ضد عفونی کننده به دو صورت طبیعی و اکتسابی است. مقاومت طبیعی اغلب در باکتری‌های گرم منفی، مایکوباکترها و اسپورهای باکتری‌ها مشاهده می‌شود. این نوع مقاومت مربوط به خصوصیات ذاتی سلول‌های میکروبی و متابولیسم آن‌هاست. از جمله عوامل ایجاد مقاومت طبیعی وجود لایه‌های محافظتی، تجزیه این مواد در داخل سلول و خارج کردن فعال آن‌ها از سلول است (۳-۶).

با توجه به پدیده ظهور و گسترش مقاومت، جستجوی ترکیبات ضد عفونی کننده با قدرت اثر بالا و سمیت کم برای استفاده در پزشکی و صنعت (به خصوص صنایع غذایی) اهمیت ویژه دارد. بر این اساس تولید محصولات جدید بر پایه ترکیبات چهارتایی آمونیوم ارزش زیادی پیدا کرده است. اثر ضد میکروبی این ترکیبات، بستگی به نوع بنیان‌های چهارگانه آن‌ها دارد (شکل ۱).

آن‌ها به مدت ۲۴ ساعت در درجه حرارت مناسب) تهیه گردید. سپس رقت متوالی تا ۰/۰۰۱ در سرم فیزیولوژی استریل انجام گردیده و به مقدار ۱۰ میکرولیتر از هر لوله به پتری دیش‌های حاوی هر دو محیط کشت همراه با غلظت مساوی از مواد سنتز شده افزوده شد. پس از ۴۸-۲۴ ساعت انکوباسیون در ۳۷ درجه سانتی‌گراد، نتایج مورد بررسی قرار گرفتند. حداقل غلظت ممانعت‌کنندگی (MIC) هر کدام از مواد برای ۱۰ باکتری مورد مطالعه (در هر دو محیط کشت) تعیین گردید.

کشت مخمرها روی محیط کشت SDA و Enrichment culture نیز طبق روش شرح داده شده در بالا انجام گردید. کشت قارچ‌ها روی محیط کشت پوتیتوآگار با  $\text{pH}=7/2$  انجام گردید، سپس پتری دیش‌ها در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد انکوبه شده و پس از ۴۸ و ۹۶ ساعت نتایج مورد بررسی قرار گرفته و قطر هاله اندازه‌گیری شد. میزان MIC هر ماده برای ۸ قارچ مورد بررسی محاسبه گردید.

### یافته‌ها

#### ۱- بررسی فعالیت ضدباکتریایی

نتایج کشت باکتری در جدول ۱ آمده است. با بررسی این جدول می‌توان نتیجه گرفت که ترکیبات شماره ۲، ۷، ۸، ۹، ۱۲ و ۱۳ دارای بیشترین فعالیت ضد میکروبی (کمترین MIC) بوده‌اند، همچنین این مواد دارای بیشترین اثر روی باکتری‌های گرم مثبت بوده و MIC به‌دست آمده بین ۲۵-۵ میلی‌لیتر/میکروگرم بوده است. لازم به‌ذکر است که مواد اشاره شده دارای MIC بین ۵۰۰-۲۵۰ میکروگرم بر میلی‌لیتر برای باکتری‌های پseudomonas aeruginosa، پseudomonas putida و سراتیا مارسینس می‌باشند.

بررسی تأثیر ترکیب محیط کشت بر فعالیت

باکتری‌های گرم منفی شامل: اشرشیا کلی B، پseudomonas aeruginosa PA۰۱، پseudomonas putida M، سراسشیا مارسینس، پانت‌آ هربی کلا EH۱۰۳، سالمونلا تیفی موریوم TA۱۰۰ بودند. باکتری‌های گرم مثبت شامل: استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس، استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سوبتیلیس ۴۹۴ و سارسینا لوت‌آ بودند.

قارچ‌ها شامل: پنی‌سیلیوم لیویدوم، فوزاریوم اکسوسپوریوم، موکور، وتریدیس سینه‌رأ، تریکودرما ویریدوآ، اسپیرژیلوس نیگرا، اسکلوروتینا اسکلوروتیروم، آلترناریا آلترناریوم بودند.

مخمرها عبارت از: پی‌چینا پاستوریس، لیپومایسز لیپوفر، هانسینولا، ساکارومایسس سرویسیه Y-۱۴۷، کروپتوکوکوس لائورنتیو Y-۳۶، رودوتورولا روبرا، کاندیدا یوتی لیس Y-۳۵ و کاندیدا بویدینا Y-۲۹ بودند.

کشت باکتری‌ها: جهت کشت باکتری‌ها از محیط کشت مایع "نوترینت برات" (Merck) و محیط کشت غنی‌کننده گلوکز (۲ درصد) - نمکی محتوی عصاره مخمر ۰/۵ درصد (Enrichment culture) استفاده شد.

کشت مخمرها و قارچ‌ها: برای کشت مخمرها از محیط کشت سابورو دکستروز آگار (SDA) (Merck) و محیط کشت غنی‌کننده گلوکز (۲ درصد) - نمکی محتوی عصاره مخمر ۰/۵ درصد (Enrichment culture) و جهت کشت قارچ‌ها از محیط کشت "پوتیتوآگار" (Potato Agar) (Merck) استفاده گردید.

#### تعیین حداقل غلظت ممانعت‌کنندگی (MIC)

کشت ۲۴ ساعته هر کدام از باکتری‌ها (تلقیح باکتری در لوله‌های حاوی محیط کشت مایع و قرار دادن

## ضدباکتریایی ترکیبات

MIC ترکیب شماره ۸ برای تمام باکتری‌های گرم مثبت و همچنین ۴ تا از ۶ سوش گرم منفی در دو محیط کشت نوترینت براث و غنی کننده، ثابت بوده و فقط برای اشرشیا کلی B و پانته‌آ هربی کلا ۱۰۳ EH متفاوت بود، یعنی برای ۸ گونه از ۱۰ گونه مورد

بررسی مقدار MIC مستقل از ترکیب محیط کشت

بوده و ثابت ماند.

در مورد ترکیب شماره ۹، MIC در دو محیط کشت

برای ۶ گونه و در رابطه با ترکیب شماره ۱۳ نیز برای

۷ گونه ثابت بود (جدول ۱).

جدول ۱) حداقل غلظت ممانعت کنندگی MIC (برحسب میلی لیتر/میکروگرم)

No16	No15	No14	No13	No12	No11	No10	No9	No8	No7	No6	No5	No4	No3	No2	No1	سوش‌های باکتری
>۵۰۰	>۵۰۰	>۵۰۰	۱۲۵	۲۵۰	>۵۰۰	>۵۰۰	۲۵	۵	۱۰۰	>۵۰۰	>۲۵۰	>۲۵۰	>۵۰۰	۵۰	>۱۰۰	Escherichia coli B
>۵۰۰	>۵۰۰	>۵۰۰	>۲۵۰	۲۵۰	>۵۰۰	>۵۰۰	۲۵۰	۵۰۰	>۵۰۰	>۵۰۰	>۲۵۰	>۲۵۰	>۵۰۰	>۵۰۰	>۵۰۰	Pseudomonas aeruginosa PA01
>۵۰۰	>۵۰۰	>۵۰۰	۲۵۰	۲۵۰	>۵۰۰	>۵۰۰	۲۵۰	۵۰۰	>۵۰۰	>۵۰۰	>۲۵۰	>۲۵۰	>۵۰۰	>۱۰۰	>۵۰۰	Pseudomonas putida M
>۵۰۰	>۵۰۰	>۵۰۰	>۲۵۰	۲۵۰	>۵۰۰	>۵۰۰	۲۵۰	>۵۰۰	>۵۰۰	>۵۰۰	>۲۵۰	>۲۵۰	>۵۰۰	>۵۰۰	>۵۰۰	Serratia marcescens s
>۵۰۰	۲۵۰	>۵۰۰	۱۲۵	۱۲۵	۵۰۰	>۵۰۰	۱۲۵	۲۰	۵۰۰	>۵۰۰	>۲۵۰	>۲۵۰	>۵۰۰	>۱۰۰	>۲۵۰	Pantoea herbicola EHI03
۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۱۲۵	۱۲۵	۲۵۰	۲۵۰	۱۲۵	۱۰	۱۰۰	>۲۵۰	>۲۵۰	>۲۵۰	۱۲۵	۱۰	>۱۰۰	Salmonella typhimurium TA100
>۵۰۰	۲۵۰	۱۲۵	۱۲۵	۱۲۵	۱۲۵	۲۵۰	۱۲۵	۵	۱۰	۱۰	>۲۵۰	>۲۵۰	۱۲۵	۱۰	۱۰۰	Staphylococcus saprophyticus s
	۱۲۵	۱۲۵	۱۲۵	۱۲۵	۲۵	۲۵۰	۱۲۵	۵	۲۰	>۱۰۰	۵۰	۱۲۵	۱۲۵	۱۰	۱۰۰	Staphylococcus aureus
>۵۰۰	۲۵	>۲۵۰	۲۵	۱۲۵	۱۲۵	>۵۰۰	۱۲۵	۵	۲۵۰	۱۰۰	۲۵۰	۵۰	۲۵۰	۱۰	>۱۰۰	Bacillus subtilis 494
>۲۵۰	>۲۵۰	۱۲۵	۲۵	۱۲۵	۱۲۵	۱۲۵	۲۵	۵	۵	۱۰	>۲۵۰	>۲۵۰	۲۵	۵	۱۰۰	Sarcina lutea

MIC برای این مواد در محیط کشت سابورو نسبت به محیط کشت غنی کننده گاهی دو برابر یا حتی بیشتر شده است که نشان‌دهنده نیازه غلظت بالاتر ترکیبات ذکر شده جهت جلوگیری از رشد مخمرها

بررسی مقدار MIC برای گونه‌های مخمر در محیط کشت‌های مختلف نتایج به‌دست آمده از کشت مخمرها روی محیط کشت سابورو و غنی‌کننده نشان می‌دهد که مقدار

به دلیل غنی بودن محیط رشد است.

### بررسی فعالیت ضد قارچی

بررسی نتایج کشت قارچ نشان داد که مواد شماره ۹، ۱۳ و ۱۲ علاوه بر بالاترین اثر ضدباکتریایی، دارای بیشترین تأثیر ضدقارچی نیز می‌باشند. ماده شماره ۹، ۱۰۰ درصد از رشد میسلای تمام انواع قارچ‌های مورد بررسی، ماده شماره ۱۲ بین ۱۱-۱۰۰ درصد و ماده شماره ۱۳ بین ۱۸-۱۰۰ درصد ممانعت به عمل آوردند.

### بحث

حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد در ترکیب شماره ۱۲ برای تمام باکتری‌های گرم منفی و همه باکتری‌های گرم مثبت به جز استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس در دو محیط کشت نوترینت براث و غنی کننده ثابت بود. از نتایج این تحقیق می‌توان چنین نتیجه گرفت که معمولاً مقدار MIC مواد مورد بررسی ثابت بوده که نشانگر عدم وابستگی غلظت ممانعت کننده از رشد اکثر باکتری‌ها به ترکیب محیط کشت می‌باشد.

وجود گروه‌های مشابه در محل رادیکال R1 نمی‌تواند باعث شباهت اثر آنتی‌میکروبی و ضدقارچی باشد (۷-۹). برای مثال ترکیبات شماره ۱، ۲ و ۳ در جایگاه R1 دارای گروه H اند اما از نظر اثر ضد میکروبی کاملاً متفاوتند (۸). همچنین ترکیبات شماره ۹، ۱۰ و ۱۱ نیز دارای گروه OC6H در محل رادیکال R1 اند اما اثر ضد میکروبی کاملاً متفاوت دارند.

علاوه بر این مشاهده شد که در محل رادیکال R2 اکثر ترکیبات حاوی H بوده در حالی که از نظر خصوصیت ضد میکروبی کاملاً متفاوتند. با بررسی گروه‌های قرار گرفته در محل رادیکال R3 ملاحظه گردید که مواد شماره ۲ و ۷ دارای گروه‌های مشابه در

این محل بوده و از نظر اثر ضد میکروبی نیز دارای دومین و سومین رتبه بین مواد مورد بررسی می‌باشند. ترکیبات شماره ۸، ۹، ۱۲ و ۱۳ نیز دارای گروه مشابه در محل رادیکال R3 اند که همراه با افزایش و شباهت اثر ضدباکتریایی و ضدقارچی این ترکیبات می‌باشد. در سال ۲۰۰۳ از کورتز (Ozkortz) نشان داد که مواد ضد میکروبی با پایه ترکیبی آمونیم کلراید چهار ظرفیتی بر روی باکتری‌های گرم مثبت و منفی مقاوم و حساس به آنتی‌بیوتیک تأثیر دارد که با تحقیق حاضر مطابقت دارد (۱۲).

در سال ۲۰۰۵ گوردین (Gordin) ثابت کرد که شستشوی دست‌ها با مایعی بر پایه ترکیبات الکلی، منجر به کاهش عفونت‌های بیمارستانی و باکتری‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک می‌گردد اما این ماده تأثیر چندان مناسبی بر روی باکتری‌های مقاوم بیمارستانی ندارد. نتیجه این تحقیق برخلاف مطالعه حاضر است (۱۳).

نقش مهم غشاء خارجی باکتری‌ها در مقاومت به دزانتکتان‌ها مربوط به ترکیبات تشکیل دهنده غشاء خارجی است، باکتری پseudomonas آئروژینوزا در مقایسه با سایر باکتری‌ها از مقاومت بالاتری در مقابل ضد عفونی کننده‌ها برخوردار است، زیرا در ترکیب لیپولی ساکارید و مقادیر کاتیون‌های موجود در غشاء خارجی آن در مقایسه با سایر باکتری‌ها تفاوت وجود دارد. به همین دلیل در مطالعه حاضر از pseudomonas آئروژینوزا مقاوم به آنتی‌بیوتیک به عنوان شاخصه باکتری‌های گرم منفی مقاوم استفاده شد (۱۲ و ۱۳).

نهایتاً می‌توان نتیجه گرفت که عملاً طبیعت گروه قرار گرفته در جایگاه R3 تعیین کننده میزان ظهور اثر ضد میکروبی ترکیبات چهارتایی آمونیوم می‌باشد. در این ترکیبات قرار گرفتن گروه C1-C18- الکیل یا

بیشترین اثر ضد عفونی کنندگی اند انتخاب و بدین ترتیب با مسئله مقاومت میکروبی ایجاد شده در برابر ترکیبات ضد عفونی کننده مقابله نمود و از گسترش عفونت‌ها به خصوص عفونت‌های بیمارستانی جلوگیری کرد (۱۴-۱۱).

### نتیجه گیری

در این تحقیق مشخص گردید که گروه قرار گرفته در محل رادیکال R3 بالاترین نقش را در ظهور اثر ضد میکروبی QACS ها ایفا می‌کند. این مسئله در طراحی مواد ضد میکروبی جدید با هدف افزایش اثر ضد میکروبی و مقابله با مقاومت میکروبی اهمیت دارد.

بنزیل در محل رادیکال R3 باعث افزایش اثر ضد میکروبی می‌گردد (۶ و ۱۰).

با بررسی اثر ضد میکروبی ۱۶ ترکیب سنتزی جدید QACS ترکیبات شماره ۲، ۷، ۸، ۹، ۱۲ و ۱۳ که دارای بالاترین درجه ممانعت کنندگی رشد بودند به عنوان بهترین مواد انتخاب شدند.

با مقایسه ساختمان ترکیبات مورد آزمایش می‌توان نتیجه گرفت که گروه قرار گرفته در محل رادیکال R3 بالاترین نقش را در ظهور اثر ضد میکروبی QACS ها ایفا می‌کند. بنابراین با جایگزین کردن گروه‌های مختلف در این محل و بررسی اثر ضد میکروبی ترکیبات جدید می‌توان بهترین گزینه‌ها را که دارای

### References:

- Ivanova EB. Russian quaternary ammonium compound-based disinfecting agents. *Gig Sanit* 2000; 3: 19-22.
- Nic, M.; Jirat, J.; Kosata, B., eds. (2006). "quaternary ammonium compounds". IUPAC Compendium of Chemical Terminology (Online ed.). doi:10.1351/goldbook.Q05003. ISBN 0-9678550-9-8. <http://goldbook.iupac.org/Q05003.html>.
- Turnidge JD, Ferraro MJ, Jorgensen JH. Susceptibility Test Methods: General Considerations. In: Murray PR, Baron EJ, Jorgensen JH, et al, editors. *Manual of Clinical Microbiology*. 8<sup>th</sup> Ed. Washington: American Society of Clinical Microbiology; 2003: p. 1103
- Galynkin VA. disinfection and antisepsis in medicine and industry. - St.: Folio, 2004. 95.
- March J, editor. *Advanced Organic Chemistry: Reactions, Mechanisms, and Structure*. 5<sup>th</sup> ed. New York: Wiley-Interscience: 2001.
- Sleator Roy D, Wouters J, Cormac G M Gahan, et al. Analysis of the Role of OpuC, an Osmolyte Transport System, in Salt Tolerance and Virulence Potential of *Listeria monocytogenes*. *Appl Environ Microbiol* 2001; 67: 2692-8.
- Christopher JI, Geoff WH, Stephen PD. Action of Disinfectant Quaternary Ammonium Compounds against *Staphylococcus aureus*. *Antimicrob Agents Chemother* 2007; 51: 296-306.
- Infection control recommendations for the dental office and the dental laboratory. Council on Dental Materials, Instruments, and Equipment. Council on Dental Practice. Council on Dental Therapeutics [editorial]. *J Am Dent Assoc* 1988; 116: 241-8.
- Kohn WG, Harte JA, Malvitz DM, et al. Guidelines for infection control and sterilization in dental healthcare settings. *J Am Dent Assoc* 2004; 135: 33-47.
- Oeding M. Infection control. 2004 by foundations in continuing education. WWW. [Fice.com.pdf/re.pdf](http://www.fice.com/pdf/re.pdf).
- Azimi Hoseini S, Shahcheraghi F, Ghaemmaghami A. Evaluation of the Clinical Efficacy of Quaternary Ammonium Components (QAC) As Surface Disinfectant. *Journal of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences* 2006; 3: 190-4.
- Ozkurt Z, Altoparlak U, Erol S, et al. Activity of frequently used disinfectants and antiseptics against nosocomial bacterial types. *Mikrobiyol Bul* 2003; 37: 157-62.
- Gordin FM, Schultz ME, Huber RA, et al. Reduction in nosocomial transmission of drug-resistant bacteria after introduction of an alcohol-based handrub. *Infect Control Hosp Epidemiol* 2005; 26: 650-3.
- Manivannan G, editor. *Disinfection and decontamination Principles, Applications and Related Issues*. Boca Raton, Florida: CRC press; 2008: 215-31.

*Original Article*

# Study of antimicrobial effect of novel Quaternary Ammonium Compounds on bacteria and fungi

M. Sadrnia<sup>1</sup>, R. Zheldakova A.<sup>2</sup>, M. Arjomandzadegan<sup>3\*</sup>

<sup>1</sup> Department of Biology, Payame Nor University

<sup>2</sup> Department of Biology, Belarusian State University, Nezavisimosti , 220030 Minsk, Belarus

<sup>3</sup> Tuberculosis and Pediatric Infectious Research Center and Department of Microbiology, Arak University of Medical Sciences, Arak, IRAN

(Received 16 Nov, 2012      Accepted 31 Jan, 2013)

## *Abstract*

**Background:** Quarterly Ammonium Compounds (QuAC) are the more effective antimicrobial agents in medicine and industry. It needs to produce the new compounds with the wider spectrum and less toxicity, because of microbial resistance. Aim of this study was microbiological Evaluation of the new Quarterly Ammonium Compounds produced by Structural modifications on some bacteria, yeast and fungi.

**Material and Methods:** 16 Quat salts were designed and made in Ethanol or Aceto Nitril. Minimum Inhibitory Concentration (MIC) was determined by standard method on Nutrient Broth and Minimal agar culture media for bacteria , Potato Dextrose Agar (PDA) for fungi and Nutrient Agar and Saboro Dextrose Agar (SDA) for yeasts .

**Results:** Compounds 2,7,8,9,12,13 has the more antimicrobial effect ( minimum of MIC). Furthermore, it was shown that MIC was unrelated to culture compounds. In yeast culture it must to increases the concentration in enriched media. Compounds 9,12 and 13 has the more antibacterial effect as well as antifungal effect.

**Conclusion:** In comparison of structure of produced compounds and results of the study, it was revealed that radical R3 has the most important role in antimicrobial properties of Quats and it could to be substitute any suitable group related to increasing anti microbial effects.

**Keywords:** Quarterly Ammonium Compounds, antimicrobial effects, bacteria, fungi, MIC.

\*Address for correspondence: Tuberculosis and Pediatric Infectious Research Center and Department of Microbiology, Arak University of Medical Sciences, Arak, IRAN, [mmatinam81@yahoo.com](mailto:mmatinam81@yahoo.com), [arjomandzadegan@arakmu.ac.ir](mailto:arjomandzadegan@arakmu.ac.ir)

Website: <http://bpums.ac.ir>

Journal Address: <http://ismi.bpums.ac.ir>