



ارزیابی اثر کشندگی مشتقات مختلف کورکومین بر روی تریکوموناس واژینالیس در شرایط آزمایشگاهی

مرادعلی فولادوند (PhD)^{۱*}، افشین برازش (PhD)^۲، رحیم طهماسبی (PhD)^۳، خسرو محمدی (PhD)^۴،

سلیمان خرمی (MSc)^{۱**}

^۱ گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

^۲ گروه میکروب و انگل‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

^۳ گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

^۴ گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه خلیج فارس بوشهر، بوشهر، ایران

(دریافت مقاله: ۹۵/۱۲/۱۸ - پذیرش مقاله: ۹۶/۹/۵)

چکیده

زمینه: تریکومونیاژیس یکی از شایع‌ترین بیماری‌های اداری-تناسلی در جهان می‌باشد. خط اول درمان این بیماری داروی مترونیدازول است که با توجه به وجود گزارشات مختلف از بروز مقاومت دارویی و عوارض جانبی نسبت به این دارو، تحقیقات برای یافتن داروی جدید ضروری به نظر می‌رسد. کورکومین ماده‌ای زرد رنگ است که از زردچوبه به دست می‌آید و دارای مشتقات مختلفی بوده که اثرات ضد سرطانی و آنتی‌اکسیدانی آن گزارش شده است. در پژوهش حاضر اثر کورکومین و مشتقات آن بر تریکوموناس واژینالیس مورد بررسی قرار گرفته است.

مواد و روش‌ها: از کورکومین خالص، کورکومین با خلوص ۷۰ و ۹۰ درصد، بیس دی متوکسی کورکومین BDMC، دی استیل کورکومین DAC، وانادیل کورکومین VO(CUR)۲، وانادیل دی استیل کورکومین VO(DAC)۲، ایندیوم کورکومین In(CUR)۳ و گالیوم کورکومین Ga(CUR)۳ تهیه شد. تعداد ۱۰۶ تریکوموناس واژینالیس در هر چاهک میکروپلیت ۹۶ خانه‌ای در مجاورت غلظت‌های مختلف ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰، ۴۰۰، ۶۰۰ و ۸۰۰ میکروگرم بر میلی‌لیتر در گلیسرین کورکومین و مشتقات آن اضافه کرده و به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد انکوبه شد. برای سنجش میزان کشندگی غلظت‌های مختلف کورکومین از تست (MTT) استفاده گردید و تمامی تست‌ها ۳ بار تکرار شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS ویرایش ۱۶ استفاده شد.

یافته‌ها: میزان IC50 ضد تریکومونایی کورکومین با خلوص ۷۰ و ۹۰ درصد، بیس دی متوکسی کورکومین BDMC، دی استیل کورکومین DAC، وانادیل کورکومین VO(CUR)۲، وانادیل دی استیل کورکومین VO(DAC)۲، ایندیوم کورکومین In(CUR)۳ و گالیوم کورکومین Ga(CUR)۳ به ترتیب، ۴۵۰، ۴۰۰، ۴۴۱، ۴۵۳/۲، ۴۲۷/۳، ۴۱۷/۶، ۴۴۱ و ۴۴۹/۱ میکروگرم بر میلی‌لیتر به دست آمد. اثر کشندگی این ترکیبات بر روی سلول‌های (vero) نیز به ترتیب ۳۳/۱، ۱۹، ۲۱، ۲۰/۳، ۱۷، ۲۱، ۲۵/۳، ۱۶ درصد حاصل گردید.

نتیجه‌گیری: کورکومین با خلوص ۹۰ درصد دارای بیشترین اثر ضد تریکومونایی بوده و گالیوم کورکومین دارای کمترین اثر سایتوتوکسیک بر روی سلول‌های vero می‌باشد. با توجه به نتایج به دست آمده، به نظر می‌رسد استفاده از کورکومین با فرمولاسیون لوسیونی و به صورت موضعی می‌تواند در درمان بیماران مبتلا به تریکومونیاژیس مؤثر واقع شود.

واژگان کلیدی: تریکوموناس واژینالیس، کورکومین، ام تی تی، Vero

** بوشهر، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.

مقدمه

تریکوموناس واژینالیس یک تک یاخته تاژکدار می باشد که باعث ایجاد عفونت در دستگاه ادراری تناسلی در مردان و زنان می شود (۱). میزان ابتلا به این انگل در نقاط مختلف جهان بین (۴-۶) درصد می باشد. این میزان در هلند و آمریکا بین ۳-۱/۵ درصد بوده و در بعضی جوامع بیشتر از این میزان می باشد (۱ و ۲). تریکومونیازیس به وسیله تماس جنسی، استفاده از حوله مشترک، لباس زیر مشترک و یا با استفاده از وسایل پزشکی غیر استریل منتقل می شود. در زنان باعث واژینیت، التهاب مثانه، سوزش و خارش شده و در مردان باعث التهاب مجاری ادراری، سوزش و التهاب پروستات می شود. عواملی مانند فقر، کم سوادی، داشتن شرکای جنسی متعدد و افزایش سن می تواند باعث افزایش احتمال ابتلاء شود (۳-۶). مترونیدازول و تینیدازول دو داروی مؤثر بر ضد تریکومونیازیس می باشد. اما این داروها دارای عوارض هستند. یکی از مهم ترین عوارض جانبی مترونیدازول کارسینوژنیک بودن آن است. هر چند اثر سرطانزایی مترونیدازول در انسان اثبات نشده اما مقاومت به این آنتی بیوتیک بسیار گزارش شده است (۷). یکی از دلایل شکست درمان، عدم درمان مناسب و کامل شریک جنسی فرد می باشد اما دلیل مهم تر افزایش مقاومت به هر دو دارو می باشد (۸ و ۹).

تخمین زده می شود حدود ۵ درصد از عفونت های تریکوموناس واژینالیس به دلیل سویه های مقاوم این انگل باشد (۱۰). مترونیدازول برای باکتری ها موثر بوده و مطابق تحقیقات انجام شده دارای اثرات کارسینوژنیک در موش می باشد. اگرچه مطالعات اخیر رابطه ای بین مصرف مترونیدازول و نقص جنین را نشان نمی دهد. ولی در زنان باردار به خصوص در سه ماه اول بارداری منع مصرف دارد (۱۱-۱۳) و در طول سال های اخیر استفاده از داروهای گیاهی برای درمان اغلب عفونت ها مورد توجه و علاقه بسیاری از دانشمندان قرار گرفته است. از سال ۱۹۹۶ تاکنون گیاهان حدود نیمی از داروها را در ایالات متحده تشکیل می دهد (۱۴).

کورکومین (دی فرول متان یا بیس (۴- هیدروکسی - ۳- متوکس فنیل) ۱ و ۶- هیتادی ان - ۳ و ۵- دی ان) رنگدانه زرد رنگی است که از ریشه های گیاه *Curcuma longa* که از خانواده زنجبیل می باشد، به دست می آید. ریزوم زرد چوبه به طور وسیع برای رنگ و طعم دادن به غذا استفاده می شود. به صورت پودر به آن تورمریک می گویند و قدمت طولانی در استفاده پزشکی دارد (۱۵). از خواص کورکومین می توان به: اثرات ضد ژیاوردیا (۱۶)، اسپروزیت ایمریا تنلا (۱۷)، پلاسمودیوم (۱۸)، کریپتوسپوریدیوم پارووم (۱۹)، لیشمانیا آمازوننسیس و لیشمانیا مکزیکانا (۲۰ و ۲۱)، تریپانوزوم بروسه ایی (۲۲)، شیتوزوما مانسونی (۲۳)، و حتی HIV (۲۴) اشاره کرد. از دیگر خواص آن همچنین می توان اثرات ضد التهابی (۲۵)، آنتی اکسیدانی (۲۶) ضد سرطانی آن را بر شمرد (۲۷). مشتقی از کورکومین بنام ایندیوم کورکومین (کمپلکس فلز با کورکومین) دارای اثر ضد سرطانی می باشد (۲۸). سنتز ترکیبات جدید از کورکومین می تواند به تولید داروهای گیاهی با کارایی بیشتر بینجامد. گزارش سنتز ترکیب آنالوگ منوکربن کورکومین (۲۹) یا ساخت کونژوگه فعال زیستی از کورکومین توسط دابی (Dubey) و همکاران وجود دارد (۳۰). از این رو برای انجام مطالعه جامع بر روی انواع کورکومین و مشتقات به دست آمده کورکومین بر روی تریکوموناس از کورکومین با خلوص ۷۰ درصد، کورکومین با خلوص ۹۰ درصد، بیس دی متوکسی کورکومین BDMC، دی استیل کورکومین DAC، و انادیل کورکومین ۲ VO(CUR)، و انادیل دی استیل کورکومین ۲ VO(DAC)، ایندیوم کورکومین ۳ In(CUR) و گالیوم کورکومین ۳ Ga(CUR) استفاده شد. متأسفانه در ایران مطالعات کمی روی خواص این منابع ارزشمند انجام شده است و مطالعات زیست فناوری در این زمینه ضروری می باشد. لذا در این تحقیق به بررسی اثرات ضد تریکومونایی کورکومین خالص و مشتقات مختلف کورکومین پرداخته شد.

مواد و روش‌ها

کشت انگل

انگل تریکوموناس واژینالیس از بیماران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر بوشهر جداسازی شد. در این بیماران ابتدا واژن توسط متخصص زنان معاینه شده و در بیمارانی که دارای علائم مشابه ابتلا به تریکومونیازیس بودند مانند سندرم واژن توت فرنگی و نقاط پتشی، با استفاده از سواپ نمونه‌گیری شده و بلافاصله به محیط کشت (TYI-S-33) انتقال داده شد. محیط کشت به آزمایشگاه منتقل شده و در ۳۷ درجه سانتی‌گراد به مدت ۲۴ ساعت انکوبه شد سپس یک قطره از محیط کشت روی لام ریخته شده و با عدسی ۴۰ بررسی شد اگر فرد به تریکوموناس واژینالیس مبتلا بود به راحتی شناسایی و در صورت ابتلا به سایر بیماری‌ها نمونه استریل شده دفع شد. تریکوموناس واژینالیس بعد از بررسی حدود ۶۰ نمونه شناسایی شد. تعداد ۱۰۶ انگل در حجم ۱۰۰ میکرولیتر به هر چاهک میکروپلیت ۹۶ خانه ریخته شده و به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد انکوبه گردید.

تهیه مشتقات مختلف کورکومین

کورکومین‌ها ماده مؤثره ریزوم گیاه زردچوبه با نام علمی *Difouloylmethane* و فرمول شیمیایی $(C_{12}H_{20}O_6)$ است. علاوه بر کورکومین ترکیبات شیمیایی متعدد از جمله روغن فرار، زینجیرن، آلفا و بتا تورمرین و مواد دیگر از جمله آرابینوز، فروکتوز، گلوکز و نشاسته در ریزوم گیاه زردچوبه وجود دارد. رنگ زردچوبه مربوط به مواد رنگی نظیر کورکومین، دی متوکسی کورکومین و بیس دی متوکسی کورکومین است (۳۱).

ترکیبات کورکومین را از زردچوبه با تکنیک‌های مختلفی از جمله امواج فراصوت استخراج می‌کنند. سپس از ترکیبات استخراج شده، کورکومین ۷۷ درصد، دی متوکسی کورکومین ۱۷ و ۳ درصد بیس دی متوکسی کورکومین به دست می‌آید که مولکول کورکومین از یک زنجیره اصلی آلیفاتیک تشکیل شده و گروه‌های غیر اشباع می‌توانند در

آن جایگزین شوند (۳۲). در پژوهش انجام شده تمام مشتقات کورکومین از دانشگاه خلیج فارس بوشهر (جناب آقای دکتر خسرو محمدی) تهیه شد. نحوه سنتز و مشخص کردن ساختمان آنها با استفاده از مس اسپکترومتری، اسپکتروسکوپی جذب و فرو سرخ، و آنالیز عناصر انجام شد. این ترکیبات دارای اثرات ضد سرطانی و ضد باکتریایی نیز می‌باشند (۳۳ و ۳۴).

غلظت‌های مختلف ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰، ۴۰۰، ۶۰۰ و ۸۰۰ میکروگرم بر میلی‌لیتر به صورت جداگانه از کورکومین با خلوص ۷۰ درصد، کورکومین با خلوص ۹۰ درصد و ترکیبات بیس دی متوکسی کورکومین BDMC، دی استیل کورکومین DAC، و انادیل کورکومین $VO(CUR)_2$ ، و انادیل دی استیل کورکومین $VO(DAC)_2$ ، ایندیوم کورکومین $In(CUR)_3$ و گالیوم کورکومین $Ga(CUR)_3$ با استفاده از گلیسرین و به کمک شیکر و سونیکیشن تهیه گردید.

آزمایشات

تریکوموناس واژینالیس بعد از کشت انبوه در محیط (TYI-S-33) و بررسی میکروسکوپی با لام نئوبار شمارش شده میزان ۱۰۰ میکرولیتر از هر یک از غلظت‌های تهیه شده به چاهک‌های حاوی انگل تریکوموناس واژینالیس بودند، اضافه گردید و پلیت به مدت ۴۸ ساعت در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد انکوبه شد. انجام آزمایشات به صورت سه بار تکرار *Triplicate* صورت پذیرفت. کنترل منفی دارای محیط کشت (TYI-S-33) و تریکوموناس واژینالیس بوده، و کنترل مثبت حاوی محیط (TYI-S-33)، تریکوموناس واژینالیس و همچنین داروی مترونیدازول با غلظت‌های مشابه کورکومین‌ها تهیه شده بود.

برای سنجش دقیق مرگ تریکوموناس واژینالیس و همچنین سلول‌های VERO از تست MTT استفاده شد. محلول MTT (Methylthiazolyldiphenyl-tetrazolium bromide) با غلظت ۵ میلی‌گرم بر میلی‌لیتر در محیط کشت (TYI-S-33) بدون فنل رد تهیه و پس از فیلتر شدن، به میزان ۲۰ میکرولیتر به هر چاهک اضافه

پس از آن غلظت‌های تهیه شده از کورکومین‌ها در حجم ۰/۵ میلی‌لیتر به چاهک‌ها اضافه و به مدت ۲۴ ساعت انکوباسیون ادامه یافت، در پایان با استفاده از تست MTT میزان مرگ سلولی تعیین گردید (۳۷).

یافته‌ها

میزان IC_{50} کورکومین با خلوص ۷۰ درصد = ۴۵۰ میکروگرم بر میلی‌لیتر، IC_{50} کورکومین با خلوص ۹۰ درصد = ۴۰۰ میکروگرم بر میلی‌لیتر، IC_{50} بیس دی‌متوکسی کورکومین $BDMC = 441$ میکروگرم بر میلی‌لیتر، میزان IC_{50} دی‌استیل کورکومین $DAC = 453.2$ میکروگرم بر میلی‌لیتر، IC_{50} واناویل کورکومین $VO(CUR) = 427.3$ میکروگرم بر میلی‌لیتر، میزان IC_{50} واناویل دی‌استیل کورکومین $VO(DAC) = 417.6$ میکروگرم بر میلی‌لیتر، میزان IC_{50} ایندیوم کورکومین $IN(CUR) = 441$ میکروگرم بر میلی‌لیتر و میزان IC_{50} گالیوم کورکومین $GA(CUR) = 449.1$ میکروگرم بر میلی‌لیتر می‌باشد (نمودار ۱).

بین مشتقات مختلف کورکومین اختلاف کشندگی معناداری وجود ندارد. میزان کشندگی سلولی (Cell cytotoxicity) مشتقات مختلف کورکومین بر روی سلول‌های (vero) انجام گرفت، به لحاظ آماری با آزمون من ویتنی با (۰/۰۴) Sig اختلاف بین کشندگی دوز ۵۰ و ۸۰۰ میکروگرم معنادار است (جدول ۱).


گردید و مجدداً به مدت ۴ ساعت دیگر انکوبه شد، سپس به منظور حل شدن کریستال‌های فورمازان ۱۵۰ میکرولیتر دی‌متیل سولفوکساید به هر چاهک اضافه شد (۳۵). ۲۰ دقیقه پس از افزودن دی‌متیل سولفوکساید کریستال‌ها به‌طور کامل حل شدند، جذب نوری پلیت با استفاده از دستگاه الیزا مدل (Park, Winooski, VT, USA), Biotech, Highland) در طول موج ۵۷۰ نانومتر قرائت شد و درصد کشندگی ترکیبات مورد مطالعه با استفاده از نتایج به‌دست آمده از مقادیر جذب نوری محاسبه گردید.

کشت سلول

سلول‌های vero (اپیتلیال کلیه) از انستیتو پاستور تهیه شده و با استفاده از محیط کشت (RPMI-1640) همراه با سرم جنین گوساله ۱۰ درصد، ۱۰۰ میلی‌لیتر بر واحد پنی‌سیلین، ۱۰۰ میکروگرم بر میلی‌لیتر استرپتومایسین و در شرایط حاوی ۵ درصد CO_2 و رطوبت ۹۵ درصد در دمای ۳۷ درجه کشت و به مدت ۲۴ ساعت انکوبه شدند (۳۶).

آزمایش سایتوتوکسیک

سلول‌های vero تکثیر شده، سپس محیط کشت رویی خالی شده، و با استفاده از سرم فیزیولوژی سلول‌ها شستشو داده شد، به کمک تریپسین سلول‌ها جداسازی و با استفاده از تریپان بلو، لام نئوبار شمارش شده و تعداد صد هزار سلول به هر چاهک اضافه گردید و در شرایط حاوی ۵ درصد CO_2 رطوبت ۹۵ درصد، دمای ۳۷ به مدت ۲۴ ساعت انکوبه شد



نمودار ۱) میزان IC_{50} کورکومین و مشتقات آن
Fig 1) IC_{50} of Curcumin and various derivatives

جدول ۱) درصد کشندگی مشتقات مختلف کورکومین بر روی سلول‌های (vero)						
غلظت (میکروگرم بر میلی‌لیتر)						
مشتقات مختلف کورکومین						
۸۰۰	۶۰۰	۴۰۰	۲۰۰	۱۰۰	۵۰	
٪۳۳/۱	٪۲۴/۱۵	٪۱۷/۳۶	٪۱۴/۵	٪۸	٪۲/۶	کورکومین با خلوص ۷۰ درصد
٪۱۹	٪۱۸/۴۰	٪۱۴/۲	٪۱۲	٪۸	٪۵/۱	کورکومین با خلوص ۹۰ درصد
٪۲۱	٪۱۶/۴۰	٪۱۳/۴۱	٪۱۱/۲	٪۵	٪۲/۲	بیس دی متوکسی کورکومین
٪۲۰/۳	٪۱۷/۱۵	٪۱۲/۵۲	٪۸/۵	٪۷	٪۳/۵	دی استیل کورکومین
٪۱۷	٪۱۶/۴۰	٪۱۴/۲۹	٪۱۳/۳	٪۵/۲	٪۴/۷	وانادیل دی کورکومین
٪۲۱	٪۱۹/۴۰	٪۱۸/۶	٪۱۸	٪۹/۴	٪۹/۳	وانادیل دی استیل کورکومین
٪۲۵/۳	٪۲۴/۱۵	٪۱۲/۳۶	٪۱۵/۵	٪۹	٪۳/۹	ایندیوم کورکومین
٪۱۶	٪۱۵/۴۰	٪۱۳/۶	٪۱۲/۷	٪۱۰	٪۱/۸	گالیوم کورکومین

بحث

مطالعات نشان می‌دهد که داروهای گیاهی به دلیل عوارض کم، قیمت ناچیز و دسترسی بالا می‌تواند در کنترل بسیاری از عفونت‌ها همچون تریکومونیاژیس مؤثر باشند. مترونیدازول که داروی رایج برای درمان تریکوموناس واژینالیس می‌باشد یک داروی سمی بوده و قادر به ایجاد عوارض مختلفی چون خشکی دهان، طعم فلزی در دهان، وزوز کردن گوش، مورمور شدن بدن، سوزش و تیرگی ادرار می‌باشد. این دارو در باکتری‌ها جهش‌زا و در حیوانات کارسینوژن می‌باشد (۳۸ و ۳۹). نتایج این مطالعه نشان داد که کورکومین و مشتقات آن دارای اثر ضد تریکومونایی قوی می‌باشند. اثر ضد تریکومونایی کورکومین وابسته به تهاجم آن به داخل یاخته می‌باشد. پس از مواجهه انگل‌های تریکوموناس واژینالیس با کورکومین، به سرعت شروع به جذب کورکومین کرده و متورم و زرد رنگ می‌شوند. هر چند که اثر ضد انگلی خود را بعد از چند ساعت آغاز می‌کنند. تغییرات مورفولوژیکی القا شده در انگل به صورت تورم و چروکیدگی می‌باشد (۴۰). سپس از تحرک سلول‌ها کم شده و بعد از ۷-۵ ساعت سلول‌ها بی‌تحرک شده و می‌میرند. تغییر مورفولوژیکی و مرگ تریکوموناس‌ها احتمالاً شامل آپوپتوز و لیز سلولی می‌باشد. زیرا خاصیت القا آپوپتوز کورکومین‌ها بر ضد انگل‌های دیگر و سلول‌های سرطانی توصیف شده است (۴۱ و ۴۲). ساخت دارو با اثر قوی و مؤثر با عوارض کم بر ضد انگل‌ها با توجه به اینکه دارای ساختمان سلولی یوکاریوتیک می‌باشند بسیار

دشوار است. در مطالعات مختلف ترکیبات گوناگونی در مرحله *in vitro* بر روی انگل‌ها تأثیر داده می‌شود که ممکن است باعث کشندگی نیز بشود اما دارای اثرات سمی و کشندگی برای سلول‌های انسانی و حیوانی نیز می‌باشند و بعد از صرف هزینه و زمان فراوان در مرحله *in vivo* متوجه این قضیه می‌شوند. ما در این مطالعه همراه با تأثیر کورکومین و مشتقات مصنوعی سنتز شده بر روی تریکوموناس واژینالیس، بر روی سلول پستاندار رده *vero* نیز با همان شرایط و دوز درمانی مطالعه انجام شد تا با بررسی همزمان آنها متوجه شویم که آیا کورکومین‌های مورد مطالعه دارای اثرات احتمالی سمی مشابه بر روی سلول‌های پستانداران می‌باشند؟ نتایج نشان داد گالیوم کورکومین دارای کمترین اثر کشندگی بر روی سلول‌های *vero* و در نتیجه نشان از سمیت پایین آن دارد، کورکومین با خلوص ۷۰ درصد نیز دارای دارای بیشترین سمیت برای سلول‌های *vero* بود (جدول ۱). هر چند در این مطالعه همه مشتقات کورکومین در مقایسه با مترونیدازول به دوز بسیار بالاتری برای کشتن تریکوموناس‌ها نیاز داشتند اما باید این نکته را نیز در نظر بگیریم که کورکومین دارای اثرات توکسیک و عوارض بسیار کمتری در مقایسه با مترونیدازول برای انسان دارد. در مطالعه مشابهی که توسط بنجامین واچر (Benjamin wachter) انجام شد، نشان دادند کورکومین دارای اثر کشندگی بالایی روی سویه‌های حساس، نیمه حساس و مقاوم تریکوموناس واژینالیس به مترونیدازول

واژینالیس ضد التهاب و مسکن بودن کورکومین می‌باشد (۴۹ و ۵۰)، که می‌تواند به بهبود فیزیکی بیمار بدون استفاده از داروهای دیگر بشود.

نتیجه‌گیری

نتیجه‌گیری اینجانب از این تحقیق این است که کورکومین و مشتقات فلزی ساخته شده آن در آزمایشگاه بر روی *تریکوموناس واژینالیس* در محیط *in vitro* با دوزهای قابل قبول ۴۰۰ تا ۴۵۳/۲ میکروگرم بر میلی‌لیتر مؤثر هستند با توجه به سمیت پایین‌تر برای سلول‌های *vero* گزینه مناسبی برای درمان می‌باشد. هزینه نسبتاً بالای ساخت مشتقات فلزی کورکومین و تأثیر بالاتر کورکومین ۹۰ درصد باعث می‌شود کاندید بهتری برای ساخت دارو به نظر برسد. هر چند که دارای عوارض و سمیت بیشتری بر روی سلول‌های *vero* نیز می‌باشد. کورکومین معمولی در زردچوبه دارای غلظت ۷۰ درصد است و برای تبدیل به کورکومین ۹۰ درصد باید تخلیص شود.

سپاس و قدردانی

از حمایت‌های مالی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و کارکنان محترم مرکز تحقیقات طب گرمسیری خلیج فارس که بدون کمک و مساعدت آنها انجام این تحقیق ممکن نبود، تشکر می‌نماید.

تضاد منافع

هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است.

دارد و فقط از کورکومین خالص استفاده شد. ما در این مطالعه از ترکیبات فلزی کورکومین ساخته شده بر ضد *تریکوموناس واژینالیس* استفاده کرده و نشان دادیم که خلوص ۹۰ درصد کورکومین دارای اثرات ضد *تریکومونایی* قوی‌تری می‌باشد (۴۳). مترونیدازول به صورت خوراکی یا تزریقی می‌تواند عوارض سیستماتیک بسیاری داشته باشد. با توجه به تحقیق انجام شده امید است استفاده موضعی از کورکومین به عنوان لوسیون بتواند برای درمان *تریکومونیا*یس مؤثر باشد لوسیون ۲ درصد CURCUMAL که از کورکومین با غلظت ۲۰۰۰۰ میکروگرم/ میلی‌لیتر ساخته شده است بسیار مؤثر برای درمان موضعی زخم‌های دهانی بدون داشتن عوارض جانبی قابل توجه می‌باشد (۴۴ و ۴۵).

تحمل کورکومین برای انسان نیز بسیار بالا می‌باشد و عوارض جانبی نادر بوده و معمولاً در دوزهای ≥ 8 گرم در روز برای چندین روز دیده می‌شود (۴۶). اگرچه در مورد درمان *تریکومونیا*یس، درمان موضعی ترجیح داده می‌شود، نه فقط به این خاطر که دارو حلالیت کمی در آب دارد بلکه می‌تواند غلظت بیشتری برای اپیتلیوم واژن با دوز درمانی کمتری فراهم سازد. در کنار محلول و ژل دارویی کورکومین اشکال میکرومولسیون و لیپوزومی کورکومین نیز قبلاً مورد پژوهش قرار گرفته است و بسیار مؤثر بوده است (۴۷). فرم لیپوزومی کورکومین با غلظت ۵۰ میکرومول می‌تواند سطح بالایی از غلظت کورکومین را در واژن، با جذب سیستمی بسیار کم فراهم سازد (۴۸). از فواید دیگر استفاده از کورکومین بر ضد *تریکوموناس*

References:

- Newman L, Rowley J, Vander Hoorn S, et al. Global estimates of the prevalence and incidence of four curable sexually transmitted infections in 2012 based on systematic review and global reporting PloS one 2015;10(12): e0143304.
- Geelen TH, Hoebe CJ, Dirks A, et al. Low positivity rate after systematic screening for *Trichomonas vaginalis* in three patient cohorts from general practitioners, STI clinic and a national population-based chlamydia screening study. Sex Transm Infect 2013;89(6):532-4.
- Shew ML, Fortenberry JD, Tu W, et al. Association of condom use, sexual behaviors, and sexually transmitted infections with the duration of genital human papillomavirus infection among adolescent women. Archives of pediatrics & adolescent medicine 2006; 160(2): 151-6.
- Gottlieb SL, Douglas JM, Foster M, et al. Incidence of herpes simplex virus type 2 infection in 5 sexually transmitted disease (STD) clinics and the effect of

- HIV/STD risk-reduction counseling. *Journal of Infectious Diseases* 2004; 190(6): 1059-67.
5. McClelland RS, Sangaré L, Hassan WM, et al. Infection with *Trichomonas vaginalis* increases the risk of HIV-1 acquisition. *Journal of Infectious Diseases* 2007; 195(5):698-702.
 6. Van Der Pol B, Kwok C, Pierre-Louis B, et al. *Trichomonas vaginalis* infection and human immunodeficiency virus acquisition in African women. *Journal of Infectious Diseases* 2008; 197(4):548-54.
 7. Kissinger P, Amedee A, Clark RA, et al. *Trichomonas vaginalis* treatment reduces vaginal HIV-1 shedding. *Sexually transmitted diseases* 2009; 36(1):11-6.
 8. Schmid G, Narcisi E, Mosure D, et al. Prevalence of metronidazole-resistant *Trichomonas vaginalis* in a gynecology clinic. *The Journal of reproductive medicine* 2001;46(6):545-9.
 9. Hager WD. Treatment of metronidazole-resistant *Trichomonas vaginalis* with tinidazole: case reports of three patients. *Sexually transmitted diseases* 2004; 31(6):343-5.
 10. Petrin D, Delgaty K, Bhatt R, et al. Clinical and microbiological aspects of *Trichomonas vaginalis*. *Clinical microbiology reviews* 1998; 11(2):300-17.
 11. Connor TH, Stoeckel M, Evrard J, et al. The contribution of metronidazole and two metabolites to the mutagenic activity detected in urine of treated humans and mice. *Cancer research* 1977; 37(2):629-33.
 12. Lindmark DG, Müller M. Antitrichomonad action, mutagenicity, and reduction of metronidazole and other nitroimidazoles. *Antimicrobial agents and chemotherapy* 1976;10(3):476-82.
 13. Koss CA, Baras DC, Lane SD, et al. Investigation of metronidazole use during pregnancy and adverse birth outcomes. *Antimicrobial agents and chemotherapy* 2012; AAC-06477-11.
 14. Clark AM. Natural products as a resource for new drugs. *Pharmaceutical research* 1996; 13(8): 1133-41.
 15. Chattopadhyay I, Biswas K, Bandyopadhyay U, et al. Turmeric and curcumin: Biological actions and medicinal applications. *CURRENT SCIENCE-BANGALORE* 2004; 87(1): 44-53.
 16. Perez-Arriaga L, Mendoza-Magana ML, Cortes-Zarate R, et al. Cytotoxic effect of curcumin on *Giardia lamblia* trophozoites. *Acta tropica* 2006; 98(2): 152-61.
 17. Khalafalla RE, Müller U, Shahiduzzaman MD, et al. Effects of curcumin (diferuloylmethane) on *Eimeria tenella* sporozoites in vitro. *Parasitology research* 2011; 108(4): 879-86.
 18. Mimche PN, Taramelli D, Vivas L. The plant-based immunomodulator curcumin as a potential candidate for the development of an adjunctive therapy for cerebral malaria. *Malaria journal* 2011; 10(1):S10.
 19. Shahiduzzaman M, Dyachenko V, Khalafalla RE, et al. Effects of curcumin on *Cryptosporidium parvum* in vitro. *Parasitology research*. 2009;105(4):1155-61.
 20. Koide T, Nose M, Ogihara Y, et al. Leishmanicidal effect of curcumin *in vitro*. *Biological and Pharmaceutical Bulletin* 2002; 25(1): 131-3.
 21. Changtam C, de Koning HP, Ibrahim H, et al. Curcuminoid analogs with potent activity against *Trypanosoma* and *Leishmania* species. *European journal of medicinal chemistry* 2010; 45(3): 941-56.
 22. Allam G. Immunomodulatory effects of curcumin treatment on murine schistosomiasis *mansoni*. *Immunobiology* 2009; 214(8): 712-27.
 23. Jordan WC, Drew CR. Curcumin--a natural herb with anti-HIV activity. *Journal of the National Medical Association* 1996; 88(6): 333.
 24. Barthelemy S, Vergnes L, Moynier M, Guyot D, Labidalle S, Bahraoui E. Curcumin and curcumin derivatives inhibit Tat-mediated transactivation of type 1 human immunodeficiency virus long terminal repeat. *Research in virology* 1998; 28;149(1):43-52.
 25. Chainani-Wu N. Safety and anti-inflammatory activity of curcumin: a component of tumeric (*Curcuma longa*). *The Journal of Alternative & Complementary Medicine* 2004; 9(1): 161-8.
 26. Wei QY, Chen WF, Zhou B, et al. Inhibition of lipid peroxidation and protein oxidation in rat liver mitochondria by curcumin and its analogues. *Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-General Subjects* 2006; 1760(1):70-7.
 27. Devasena T, Rajasekaran KN, Gunasekaran G, et al. Anticarcinogenic effect of bis-1, 7-(2-hydroxyphenyl)-hepta-1, 6-diene-3, 5-dione a curcumin analog on DMH-induced colon cancer model. *Pharmacological research* 2003; 47(2):133-40.
 28. Mohammadi K, Thompson KH, Patrick BO, et al. Synthesis and characterization of dual function vanadyl, gallium and indium curcumin complexes for medicinal applications. *Journal of inorganic biochemistry* 2005; 99(11): 2217-25.

29. Liang G, Yang S, Jiang L, et al. Synthesis and anti-bacterial properties of mono-carbonyl analogues of curcumin. *Chemical and Pharmaceutical Bulletin* 2008; 56(2): 162-7.
30. Dubey SK, Sharma AK, Narain U, et al. synthesis and characterization of some bioactive conjugates of curcumin with glycine, glutamic acid, valine and demethylenated piperic acid and study of their antimicrobial and antiproliferative properties. *European journal of medicinal chemistry* 2008; 43(9):1837-46.
31. Khan IA, Abourashed EA. Leung's encyclopedia of common natural ingredients: used in food, drugs and cosmetics. John Wiley & Sons 2011; 50.
32. Ammon HP, Wahl MA. Pharmacology of *Curcuma longa*. *Planta medica* 1991; 57(1): 1-7.
33. Hamidi A, Hassani L, Mohammadi F, et al. The biological effects of vanadyl curcumin and vanadyl diacetylcurcumin complexes: the effect on structure, function and oxidative stability of the peroxidase enzyme, antibacterial activity and cytotoxic effect. *Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry* 2016; 31(6): 1124-31.
34. Jahangoshai P, Hassani L, Mohammadi F, et al. Investigating the effect of gallium curcumin and gallium diacetylcurcumin complexes on the structure, function and oxidative stability of the peroxidase enzyme and their anticancer and antibacterial activities. *JBIC Journal of Biological Inorganic Chemistry*. 2015;20(7):1135-46.
35. Zandi K, Ahmadzadeh S, Tajbakhsh S, et al. Anticancer activity of *Sargassum oligocystum* water extract against human cancer cell lines. *European review for medical and pharmacological sciences* 2010; 14(8):669-73. (Persian)
36. Mwololo SW, Mutiso JM, Macharia JC, et al. In vitro activity and in vivo efficacy of a combination therapy of diminazene and chloroquine against murine visceral leishmaniasis. *Journal of biomedical research* 2015; 29(3): 214-23.
37. Mahmoudvand H, Sepahvand P, Jahanbakhsh S, et al. Evaluation of the antileishmanial and cytotoxic effects of various extracts of garlic (*Allium sativum*) on *Leishmania tropica*. *Journal of Parasitic Diseases* 2016; 40(2):423-6.
38. Arabsalmany M, Behzadifar M, Olyaeemanesh A, et al. The prevalence of herpes simplex virus of pregnancy in Iran: A systematic review and meta-analysis. *Iranian Journal of Child Neurology* 2016; 11(2):11309. (Persian)
39. Sobel JD, Nyirjesy P, Brown W. Tinidazole therapy for metronidazole-resistant vaginal trichomoniasis. *Clinical Infectious Diseases* 2001; 15; 33(8): 1341-6.
40. Khalafalla RE, Müller U, Shahiduzzaman MD, et al. Effects of curcumin (diferuloylmethane) on *Eimeria tenella* sporozoites in vitro. *Parasitology research* 2011; 108(4): 879-86.
41. Fang HY, Chen SB, Guo DJ, et al. Proteomic identification of differentially expressed proteins in curcumin-treated MCF-7 cells. *Phytomedicine* 2011; 18(8-9): 697-703.
42. Wang L, Wang L, Song R, et al. Targeting sarcoplasmic/endoplasmic reticulum Ca²⁺-ATPase 2 by curcumin induces ER stress-associated apoptosis for treating human liposarcoma. *Molecular cancer therapeutics* 2011; 10(3): 461-71.
43. Wachter B, Syrowatka M, Obwaller A, et al. In vitro efficacy of curcumin on *Trichomonas vaginalis*. *Wiener klinische Wochenschrift*. 2014; 126(1):32-6.
44. Manifar S, Obwaller A, Gharehgozloo A, et al. Curcumin gel in the treatment of minor aphthous ulcer: A randomized, placebo-controlled trial. *Journal of Medicinal Plants* 2012; 15;1(41):40-5. (Persian)
45. Helson L. Curcumin (diferuloylmethane) delivery methods: a review. *Biofactors* 2013; 39(1): 21-6.
46. Patel BM, Mandal S, Rajesh KS. Formulation and kinetic modeling of curcumin loaded intranasal mucoadhesive microemulsion. *Journal of Pharmacy and Bioallied Sciences* 2012; 4(5): S81-S83.
47. Berginc K, Škalko-Basnet N, Basnet P, et al. Development and evaluation of an in vitro vaginal model for assessment of drug's biopharmaceutical properties: Curcumin. *AAPS PharmSciTech* 2012; 13(4): 1045-53.
48. Di Pierro F, Rapacioli G, Di Maio EA, Appendino G, Franceschi F, Togni S. Comparative evaluation of the pain-relieving properties of a lecithinized formulation of curcumin (Meriva®), nimesulide, and acetaminophen. *J Pain Res* 2013; 6: 201-5.
49. Kulac M, Aktas C, Tulubas F, et al. The effects of topical treatment with curcumin on burn wound healing in rats. *Journal of Molecular Histology* 2013; 44(1): 83-90.
50. Mohammaddoust S, Salehi Z, Saeidi Saedi H. Analysis of Ala234Thr Polymorphism SEPP1 gene in Women with Breast Cancer in Guilan Province. *ISMJ*. 2018 Jan 15;20(6):519-26.

Original Article

Lethal Effect of Various Derivatives of Curcumin on *Trichomonas vaginalis* in vitro

MA. Fouladvand (PhD)^{1*}, A. Barazesh (PhD)², R. Tahmasebi (PhD)³,
K. Mohammadi (PhD)⁴, S. Khorami (MSc)^{1**}

¹ Department of Microbiology and Parasitology, School of Medicine, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran

² Department of Laboratory Sciences, School of Paramedicine, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran

³ Department of Health, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran

⁴ Department of Chemistry, College of Sciences, Persian Gulf University, Bushehr, Iran

(Received 8 Mar, 2017 Accepted 26 Nov, 2017)

Background: Trichomoniasis is a common urogenital disease in the world. The first line of treatment for Trichomoniasis is metronidazole. Drug resistance and side effects of metronidazole urge researchers to seek new medications. Curcumin is a yellow substance derived from turmeric and has different derivatives with anticancer and antioxidant effects. We evaluated the anti-trichomonas effects of curcumin and its derivatives.

Materials and Methods: Curcumin 70%, curcumin 90%, Bisdemethoxy curcumin, Diacetyl curcumin, Vanadyl curcumin, Vanadyl diacetyl curcumin, Indium curcumin and Gallium curcumin were prepared. Different concentrations (50, 100, 200, 400, 600, 800 µg/ml) of curcumin prepared with glycerin and 10⁶ *Trichomonas vaginalis* were added to each well and incubated at 37°C for 24 h. The *in vitro* toxicity of different extracts against *Trichomonas vaginalis* was evaluated through MTT assay. All tests were performed in triplicate and SPSS software was used for data analysis.

Results: The IC₅₀ was 450, 400, 441, 453.2, 427.3, 417.6, 441 and 449.1 µg/ml, respectively for curcumin 70%, curcumin 90%, Bisdemethoxy curcumin, Diacetyl curcumin, Vanadyl curcumin, Vanadyl diacetyl curcumin, Indium curcumin and Gallium curcumin against *Trichomonas vaginalis*. Cytotoxic effects of these compounds against vero cells were 33.1%, 19%, 21%, 20.3%, 17%, 21%, 25.3% and 16%, respectively.

Conclusion: Curcumin 90% had the most activity against *Trichomonas vaginalis* and Galium curcumin had the least cytotoxic effect against vero cells. It appears curcumin lotion can be used topically to treat trichomoniasis.

Keywords: *Trichomonas vaginalis*, Curcumin, MTT, Vero

©Iran South Med J. All rights reserved.

Cite this article as: Fouladvand MA, Barazesh A, Tahmasebi R, Mohammadi K, Khorami S. Lethal Effect of Various Derivatives of Curcumin on *Trichomonas vaginalis* in vitro. *Iran South Med J* 2018; 21(2): 116-124

Copyright © 2018 Fouladvand, et al. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.

**Address for correspondence: Department of Microbiology and Parasitology, School of Medicine, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran. Email: khorami_bu@yahoo.com

ORCID: * 0000-0001--7302-6840

ORCID: **0000-0001-9408-621X