



مهمنترین توکسین‌های باکتریایی دریا؛ یک مطالعه مروری

اکرم نجفی^{۱*}، ایرج نبی‌پور^۱

^۱ مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس، پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

(دریافت مقاله: ۹۵/۳/۱۰ - پذیرش مقاله: ۹۵/۴/۸)

چکیده

زمینه: توکسین‌های میکروبی، ترکیبات سمی هستند که با هدف ایجاد بیماری و یا در پاسخ به سیستم ایمنی میزان به منظور بقا، تولید می‌گردند. شواهد زیادی مبنی بر منشاء باکتریایی توکسین‌های شناخته شده دریایی مانند ترودوتوكسین، پالی توکسین، نتوسوروگاتوکسین و غیره وجود دارد. در این مطالعه مروری، مهم‌ترین سموم دریایی تولید شده توسط گونه‌های مختلف باکتری‌های دریایی، مشا، ساختار و مکانیسم اثر آنها بررسی شدند.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقالات نمایه شده در Pubmed، Google Scholar Science Direct و Scirus مورد بررسی قرار گرفتند. واژگان مورد جستجو شامل باکتری، توکسین‌های دریایی، مکانیسم فعالیت و ساختار بودند. در مجموع از میان ۱۲۰ مقاله و گزارش، با حذف موارد مشابه، در نهایت تعداد ۱۰۳ مقاله ارزیابی گردید.

یافته‌ها: بیشتر توکسین‌های باکتریایی دریایی در یکی از گروه‌های نوروتوکسین‌ها، هپاتو توکسین‌ها و سیتو توکسین‌ها قرار می‌گیرند. این توکسین‌ها با انسداد کانال‌های سدیمی در سلول‌های عصبی، عمل به صورت آگونیست گیرنده‌های استیل کولین، مهار پمپ‌های غشایی، مهار فعالیت آنزیمی پروتئین فسفاتازهای نوع ۱ و ۲A و مهار سنتز پروتئین نقش عملکردی خود را ایفا می‌نمایند.

نتیجه‌گیری: شواهد به دست آمده از مطالعات پیشین نشان می‌دهد که آگاهی از ساختار شیمیایی و مکانیسم عمل این توکسین‌ها می‌تواند ابزار مفیدی در طراحی داروهای جدید، درمان بیماری‌ها و نیز مبارزه با بیماری‌زایی آنها باشد.

واژگان کلیدی: باکتری‌های دریایی، توکسین‌های دریایی، مسمومیت‌های دریایی، توکسینولوژی دریایی

* بوشهر، مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس، پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

Email: akna85@gmail.com

* این پژوهه با حمایت‌های کرسی پژوهشی پزشکی دریایی، (مصطفی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور) معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به انجام رسید.

در این مطالعه مروری، مهم‌ترین سموم دریایی تولید شده توسط گونه‌های مختلف باکتری‌های دریایی، ساختار و مکانیسم اثر آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

تعريف توکسین

کلمه سم (توکسین) از یک واژه در یونان باستان به نام توکسیکون^۱ گرفته شده است. توکسین، یک ماده سمی تولید شده توسط سلول‌های زنده و ارگانیسم‌ها می‌باشد. این اصطلاح برای اولین بار توسط یک شیمیدان آلمانی به نام لوڈویگ برایگر (Ludwig Brieger) قرار گرفت. اصطلاح بیوتوكسین^۲ گاهی برای نشان دادن منشا زیستی سم استفاده می‌شود. بیشتر بیوتوكسین‌ها در گروه بیوتوكسین‌های قارچی (مایکو توکسین)، میکروبی، گیاهی (فیکوتوكسین) و جانوری قرار می‌گیرند (۶).

توکسین‌ها به صورت مولکول‌های کوچک، پپتیدها و یا پروتئین‌هایی می‌باشند که می‌توانند از طریق تماس یا جذب توسط بافت‌های بدن و بر همکنش با ماکرومولکول‌های زیستی از جمله آنزیمهای گیرنده‌های سلولی ایجاد بیماری کنند.

توکسین‌های باکتریایی

سموم تولید شده توسط باکتری‌های بیماری‌زا موجب تداخل عملکردهای فیزیولوژیکی سلول‌ها شده و گاه‌هاً کشنده می‌باشند. این سموم بر روی غشاء سلولی (همولیزین، لیزین، فسفولیپاز) یا برخی از مکان‌های درون سلولی اثرگذار هستند. در اغلب موارد، سموم همگام با دیگر عوامل بیماری‌زا که باکتری‌ها را قادر به

مقدمه

دریا بیش از ۷۰ درصد از سطح کره زمین را پوشانده است. این محیط از تنوع زیستی خارق العاده‌ای برخوردار است به طوری که بیش از ۹۵ درصد از کل بیوسفر (زیست کره) را در خود جای داده است. تنوع میکروبی در این محیط منع بینهایتی از ترکیبات شیمیایی جدید را ایجاد نموده است. اگرچه ۹۹ درصد از ترکیبات میکروبی مانند آنتی بیوتیک‌ها و متابولیت‌ها از میکروارگانیسم‌های خاکی مشتق شده‌اند، با این وجود از اواخر دهه ۱۹۸۰، تلاش‌ها برای دستیابی به ترکیبات جدید و مهم زیستی از منابعی مانند دریا که کمتر مورد بررسی قرار گرفته‌اند، آغاز گردید (۱ و ۲). تجزیه و تحلیل ساده داده‌های مطالعات گذشته، نشان می‌دهد که یک جستجو با عنوان "دارو از دریا"، با افزایش ۱۳ درصدی در هر سال مواجهه بوده است و این میزان در حال افزایش می‌باشد. بنابراین به جرأت می‌توان گفت اقیانوس‌ها، کتابخانه عظیمی از ترکیبات و محصولات طبیعی منحصر به فرد و مواد فعال زیستی امیدوار کننده و شگفت‌آور می‌باشند، که هرگز در محیط زیست زمینی یافت نمی‌گردند (۳ و ۴).

توکسین‌های میکروبی، ترکیباتی هستند که به وسیله میکروارگانیسم‌هایی مانند باکتری‌ها، ویروس‌ها و قارچ‌ها تولید می‌شوند. این ترکیبات از عوامل مهم بیماری‌زایی میکروبی بوده و با هدف ایجاد بیماری و یا در پاسخ به سیستم ایمنی میزبان به منظور بقا تولید می‌گردند (۵). از طرف دیگر، توکسین‌های میکروبی دارای کاربردهای دیگری در علم پزشکی نیز می‌باشند. از این میان می‌توان به استفاده از آنها به عنوان ابزاری در نوروپیولوژی و زیست‌شناسی سلولی، مبارزه با بیماری‌زایی میکروبی و توسعه داروهای ضد سرطانی جدید و سایر داروها اشاره نمود (۶).

¹ Toxikon

² Biotoxin

گلیکوپروتئین، گانگلیوزید، استرول و مولکول‌های ناشناخته دیگر باشند (۷).

توكسین‌ها برای ورود به سلول میزبان حداقل از نوع مکانیسم استفاده می‌کنند:

۱- ورود مستقیم: برخی از سموم پروتئینی با وزن مولکولی بالا از دو پروتومر A و B ساخته شده‌اند. در این مکانیسم، بخش B از توكسین به گیرنده اختصاصی خود در سطح سلول میزبان متصل می‌شود. سپس با ایجاد یک منفذ در غشاء سلول میزبان، بخش A که سمیت اصلی را دارا می‌باشد، از این حفره به درون سلول انتقال می‌یابد (۸).

۲- ورود توسط اندوسیتوز وابسته به گیرنده: در این مکانیسم پس از اتصال توكسین به سطح سلول میزبان، فرآیند اندوسیتوز در سلول القا می‌گردد. توكسین به صورت یک اندوزوم به درون سلول وارد می‌شود. در این هنگام یون‌های H^+ به درون اندوزوم وارد شده و pH درون آن به سرعت پایین می‌آید. شرایط اسیدی تولید شده بخش B را از بخش A جدا می‌کند. در این فرآیند بخش A از درون غشاء عبور داده می‌شود و به سمت سیتوپلاسم سلول آزاد می‌گردد. اما بخش B درون اندوزوم باقی می‌ماند و از طرف دیگر سلول خارج می‌شود (۹).

نقش باکتری‌های همزیست در تولید متابولیت‌های ثانویه

در گذشته به منظور جستجوی محصولات طبیعی دریابی، مطالعات بر روی گیاهان دریابی و بی‌مهرگان نرم تن مرمرکز بوده است. با توجه به اینکه تقریباً تمام موجودات جمع‌آوری شده برای مطالعه شیمیایی دارای میکروارگانیسم‌های همراه بوده‌اند، باید به این سؤال در مورد منشاء واقعی بیوستز مولکول‌های جدا شده از

استقرار در میزبان، مقاومت و یا فرار از مکانیسم دفاعی میزبان می‌سازند، عمل می‌نمایند (۷).

اگرچه سموم باکتریابی برای سال‌های زیادی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، اما تنها تعداد کمی از آنها به طور کامل شناخته شده و مکانیسم فعالیت آنها در سطح مولکولی تعیین شده‌اند.

توكسین‌های باکتری‌ها را به طور کلی می‌توان به دو دسته تقسیم‌بندی نمود:

۱) اندوتوكسین‌ها^۳: از اجزای دیواره سلولی باکتریابی مانند غشاء خارجی می‌باشند و پس از لیز باکتری، به درون محیط آزاد می‌شوند. از بارزترین اندوتوكسین باکتریابی می‌توان به لیپوپلی ساکارید (LPS)^۴ موجود در باکتری‌های گرم منفی اشاره نمود (۵).

۲) اگزوتوكسین‌ها^۵: به طور عمده از جنس پروتئین و گاهی اوقات قطعه‌ای پلی پپتیدی هستند و از طریق غشاء باکتریابی و یا با لیز باکتری به درون محیط ترشح می‌شوند (۷).

اسامی توكسین‌ها معمولاً به محل اثرباری آنها برمی‌گردد. برای مثال انتروتوكسین (اثرباری بر روی روده و دستگاه گوارش)، نوروتوكسین (اثرباری بر روی سلول‌های عصبی)، لوکوسیدین (اثرباری بر روی لوکوسیت‌ها)، همولیزین (اثرباری بر روی سلول‌های گلبول قرمز خون)، سیتوتوكسین (اثرباری بر روی دامنه گسترهای از سلول‌های بدن میزبان) و غیره (۶ و ۷).

این اختصاصیت مربوط به حضور گیرنده‌های غشایی اختصاصی یک سم ویژه بر روی سطح سلول است. این گیرنده‌ها که معمولاً به طور تصادفی بر روی سطح غشاء توزیع شده‌اند ممکن است از جنس‌های

³ Endotoxins

⁴ Lipopolysaccharide

⁵ Exotoxins

می‌توان به توکسین‌های دریایی نئوسوروگاتوکسین (STX)، ساکسی‌توکسین (Neosurugatoxin) و سیانو‌توکسین‌ها اشاره نمود (۱۶).

تetrodotoxin (TTX)



این توکسین عصبی (نوروتوكسین) با فرمول شیمیایی $C_{11}H_{17}N_8O_3$ یک مولکول هتروسیکلیک است که برای اولین بار در سال ۱۹۰۹ توسط دانشمند ژاپنی یاشیزومی تاها را (Yashizumi Tahara) از بادکنک ماهی (Puffer fish) جداسازی و شناسایی گردید (۱۲). این سم به طور انتخابی کانال‌های سدیم را در سلول‌های عصبی و عضلانی منع می‌کند (۱۷).

TTX دارای شش گروه هیدروکسیل، یک گروه گوانیدینیوم و یک حلقه پیریدین با سیستم حلقه متصل اضافی است (شکل ۱) (۱۸). با وجود اینکه در حال حاضر این توکسین با موفقیت در آزمایشگاه سنتز می‌شود اما هنوز مسیر سنتز آن در ارگانیسم‌ها به طور کامل شناخته شده نمی‌باشد. این توکسین در pH فیزیولوژیکی دارای بار مثبت می‌باشد. از ویژگی‌های فیزیکی متمایز این سم در هنگام خالص بودن می‌توان به پودر سفید و بی‌بو، بدون طعم و محلول در آب، مقاوم در برابر حرارت (تا دمای حدود ۲۲۰ درجه سلسیوس) آن اشاره نمود (۱۱ و ۱۲). همچنین این سم ۲۵۰ بار بیشتر از سیانور سمی می‌باشد (۱۲).

بی‌مهرگان و گیاهان پاسخ داده شود. پرداختن به این سؤال زمانی اهمیت پیدا می‌کند که مشخص شده است که در مهرگان دریایی به عنوان مثال اسفنج‌ها، اجتماعات باکتری‌های همزیست حدود ۵۰ درصد از کل توده زیستی (بیوماس) آنها را تشکیل می‌دهند (۱۰).

شواهد زیادی مبنی بر منشاء باکتریایی متابولیت‌های دریایی وجود دارد. قابل توجه‌ترین مثال برای تولید باکتریایی یک متابولیت که در اصل به موجود زنده دیگری نسبت داده شده است، مربوط به یک توکسین عصبی به نام تetrodotoxin (TTX) می‌باشد. تحقیقات در مورد منشاء این سم نشان داد که TTX به عنوان یک محصول تخمیری از باکتری ویبریو و سودوموناس تولید می‌گردد (۱۱). مطالعات اخیر نشان داد که TTX توسط انواع مختلف دیگری از باکتری‌های دریایی با تاکسونومی‌های متنوع تولید می‌شوند. از این میان می‌توان به باسیلوس (۱۲ و ۱۳)، فتویاکتریوم (۱۲)، شیوانلا (۱۲ و ۱۴)، استرپتومایزر (۱۵)، موراکسلا، آلتروموناس، اسینتویاکتر و اروموناس اشاره نمود (۱۳).

این اطلاعات پیشنهاد می‌کند که باکتری‌ها تنها منشا TTX هستند که ممکن است از طریق زنجیره غذایی در بی‌مهرگان تجمع یابند. از طرف دیگر با افزایش مطالعات در این زمینه، توکسین‌های دیگری نیز با منشا باکتری‌های دریایی شناسایی شده‌اند. از این میان



شکل ۱) ساختار شیمیایی تetrodotoxin، سم عصبی تولید شده توسط چندین گونه باکتریایی (۱۸)

در مطالعات مختلف، حضور باکتری‌های تولید کننده تترودوتوکسین در رسوبات دریایی به اثبات رسیده است (۱۵). دو (Do) و همکاران در سال ۱۹۹۰ در ژاپن، رسوبات دریایی را با هدف شناسایی باکتری‌های تولید کننده تترودوتوکسین مورد بررسی قرار دادند. با توجه به نتایج آنها مشخص گردید که باکتری‌های تولید کننده TTX محدود به گروه تاکسونومیکی خاصی نمی‌باشند. گروه‌های مختلفی از باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی از جمله باسیلوس، میکروکوکوس، اسیتوبacter، اروموناس، آلکالیزنر، آلتروموناس، فلاوبacterium، موراکسلا، سودوموناس و ویبریو تووانایی تولید سم TTX را دارا بودند (۱۳). همچنین این محقق در سال ۱۹۹۳ با بررسی رسوبات دریاچه سووا^{۱۲} در ژاپن، موفق به جداسازی ۵ جنس باکتریایی تولید کننده TTX گردید (۲۱). این باکتری‌ها شامل جنس‌های باسیلوس، میکروکوکوس، کائولوبacter^{۱۳} و فلاوبacterium بودند. سوشا (Sousa) و همکاران در سال ۲۰۱۱، باکتری‌های تولید کننده تترودوتوکسین جداسازی شده از دو گونه شکم پایان دریایی (گاستروپود) به نام‌های مونودونتا توربینات^{۱۴} و جی بولا آمبیلیکالیس^{۱۵} را در سواحل شمالی پرتغال مورد بررسی قرار دادند (۱۲). یافته‌های آنها نشان داد که باکتری‌های شناسایی شده متعلق به جنس‌های ویبریو، سودوآلتروموناس، شیوانلا، فتوبacterium و باسیلوس بوده‌اند.

سیمیدو (Simidu) و همکاران در سال ۱۹۹۰، تعداد ۳ سویه باکتری دریایی تولید کننده تترودوتوکسین را از سطح جلبک‌های قرمز و ماهی بادکنکی در ژاپن

در سال‌های اخیر توزیع گسترده TTX در میان گروه‌های متنوع از موجودات به اثبات رسیده شده است (۱۳). نوگوشی (Noguchi) و همکاران در سال ۱۹۸۶ اولین باکتری تولید کننده TTX که متعلق به جنس ویبریو بود را از روده خرچنگ دریایی (Atergatis floridus) (فلوریدوس) جداسازی نمودند. در همین سال باکتری سودوموناس به عنوان دومین جنس تولید کننده TTX از جلبک‌های آهکی قرمز دریایی (جانیا اس بی).^۶ جداسازی و معرفی گردید (۱۱). تعداد سویه‌های باکتریایی تولید کننده این توکسین به سرعت در حال گسترش هستند؛ به طوری که از سال ۱۹۸۶ تاکنون بیش از ۲۳ جنس از باکتری‌های دریازی به عنوان تولید کنندگان میکروبی TTX معرفی شده‌اند. بر همین اساس، باکتری‌های تولید کننده TTX از نظر تاکسونومی در ۴ شاخه پروتوبacterيا^۷، اکتینوبacterيا^۸، فرمیکات^۹ و باکتروئیدتس^{۱۰} قرار می‌گیرند. از این میان، شاخه پروتوبacter به عنوان شاخه غالب در تولید این سم شناخته شده است (۱۱).

گونه‌های موجود در جنس ویبریو به ویژه ویبریو آثرینولا یتیکوس^{۱۱} به عنوان غالب‌ترین تولید کنندگان TTX مطرح می‌باشند (۱۷ و ۱۹). با توجه به تولید باکتریایی این سم (۱۳)، این فرضیه که باکتری‌ها تولید کنندگان اصلی این سم در طبیعت می‌باشند، منطقی به نظر می‌رسد. با این وجود، در برخی از مطالعات محدود، عدم وجود باکتری در موجودات دریایی تولید کننده تترودوتوکسین گزارش شده است (۲۰).

⁶ Jania sp.⁷ Proteobacteria⁸ Actinobacteria⁹ Firmicutes¹⁰ Bacteroidetes¹¹ Vibrio alginolyticus¹² Suwa¹³ Caulobacter¹⁴ Monodonta turbinata¹⁵ Gibbula umbilicalis

در جدول ۱ به طور خلاصه باکتری‌های تولید کننده TTX که از منابع مختلف مانند آب تازه و رسوبات دریایی و نیز از مصرف کنندگان اولیه و ثانویه مانند پلانکتون، جلبک قرمز دریایی، کرم‌های روبانی، گاستروپودها، ماهی ستاره، خرچنگ xanthid، هشت پا حلقه‌دار آبی و بادکنک ماهیان جداسازی شده‌اند، نشان داده شده است.

جداسازی و از نظر تاکسونومی مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج آنها نشان داد که باکتری‌های جداسازی شده به دلیل عدم شباهت با جنس و گونه‌های شناخته شده در گروه‌های جدید قرار می‌گیرند. به همین دلیل *Listonella plagia* sp. این ۳ سویه را به صورت *Alteromonas tetaodonis* sp. II nov. بیووار *Shewanella alga* sp. nov. و nov. نامگذاری نمودند (۱۴).

جدول ۱) تنوع باکتریایی دریایی تولید کننده توکسین تترودوتوکسین (TTX)

رفرانس	سال	کشور	منبع جداسازی	ارگانیسم	شاخه
				Vibrionaceae	
۱۲	۲۰۱۱	پرتغال	شکم پا (<i>Gibbula umbilicalis</i>)		
۱۲	۲۰۱۱	پرتغال	شکم پا (<i>Monodonta turbinata</i>)		
۲۲	۲۰۰۰	کره جنوبی	بادکنک ماهی (<i>Fugu vermicularis radiates</i>)	Vibrio sp.	
۱۳	۱۹۹۰	ژاپن	رسوبات دریایی		
۲۳	۲۰۰۸	چین	شکم پا (<i>Nassarius semiplicatus</i>)		
				Vibrionaceae strains	
۱۲	۲۰۱۱	پرتغال	شکم پا (<i>Monodonta turbinata</i>)	<i>Vibrio splendidus</i>	
۱۲	۲۰۱۱	پرتغال	بیوفیلم	<i>Vibrio gallaecicus</i>	
۱۲	۲۰۱۱	پرتغال	شکم پا (<i>Gibbula umbilicalis</i>)	<i>Vibrio gigantis</i>	
۱۲	۲۰۱۱	پرتغال	شکم پا (<i>Monodonta turbinata</i>)	<i>Vibrio tasmaniensis</i>	
۱۲	۲۰۱۱	پرتغال	شکم پا (<i>Gibbula umbilicalis</i>)	<i>Vibrio tapetis</i>	
۱۲	۲۰۱۱	پرتغال	شکم پا (<i>Monodonta turbinata</i>)	<i>Vibrio cyclitrophicus</i>	
۲۴	۱۹۸۷	ژاپن	روده بادکنک ماهی (<i>Fugu vermicularis vermicularis</i>)	<i>Vibrio alginolyticus</i>	
۲۵	۱۹۹۵	تایوان	شکم پا (<i>Niotha clathrata</i>)	<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	
۲۶	۱۹۸۷	ژاپن	خرچنگ Xanthid	<i>Vibrio fuscheri</i>	
۲۷	۲۰۰۹	آمریکا	بادکنک ماهی (<i>Arothron hispidus</i>)	<i>Vibrio harveyi</i>	
۱۲	۲۰۱۱	پرتغال	شکم پا (<i>Monodonta turbinata</i>)	<i>Photobacterium</i>	
۱۴	۱۹۹۰	ژاپن	بادکنک ماهی	II بیووار <i>Listonella plagia</i> sp. nov.	
۱۴	۱۹۹۰	ژاپن	جلبک قرمز (<i>Jania</i> sp.)		
				Pseudomonadaceae	
۲۸	۱۹۸۷	ژاپن	پوست بادکنک ماهی (<i>Fugu poailonotus</i>)	<i>Pseudomonas</i> sp.	
۱۳	۱۹۹۰	ژاپن	رسوبات دریایی		
۲۵	۱۹۹۵	تایوان	شکم پا (<i>Niotha clathrata</i>)		
۲۹	۱۹۸۶	ژاپن	جلبک قرمز (<i>Jania</i> sp.)		
				Enterobacteriaceae	
۳۰	۲۰۰۵	هنگ کنگ	بادکنک ماهی (<i>Chelonodon patoca</i>)	<i>Serratia marcescens</i>	
۳۱	۲۰۰۴	هنگ کنگ	بادکنک ماهی (<i>Chelonodon patoca</i>)		
۳۲	۲۰۱۱	هنگ کنگ	روده بادکنک ماهی (<i>Takifugu niphobles</i>)	<i>Raoultella terrigena</i>	

رفرنس	سال	کشور	منبع جداسازی	ارگانیسم	شاخه	
۱۷	۲۰۱۵	چین	(<i>Yongeichthys criniger</i>) ماهی سمی	<i>Enterobacter cloaca</i>		
۱۷	۲۰۱۵	چین	(<i>Yongeichthys criniger</i>) ماهی سمی	<i>Rahnella aquatilis</i>		
				Aeromonadaceae		
۱۳	۱۹۹۰	ژاپن	رسوبات دریایی	Aeromonas sp.		
۲۵	۱۹۹۵	تایوان	شکم پا (<i>Niotha clathrata</i>)			
۲۳	۲۰۰۸	چین	شکم پا (<i>Nassarius semiplicatus</i>)			
۳۳	۲۰۱۰	چین	بادکنک ماهی (<i>Takifugu obscurus</i>)	<i>Aeromonas molluscorum</i>		
				Shewanellaceae		
۲۳	۲۰۰۸	چین	شکم پا (<i>Nassarius semiplicatus</i>)	<i>Shewanella sp.</i>		
۱۲	۲۰۱۱	پرتغال	شکم پا (<i>Monodonta turbinata</i>)	<i>Shewanella pacifica</i>		
۳۴	۲۰۰۷	ژاپن	پاروپیان (<i>Pseudocaligus fugu</i>)	<i>Shewanella woodi</i>		
۱۲	۲۰۱۱	پرتغال	شکم پا (<i>Monodonta turbinata</i>)	<i>Shewanella surugensis</i>		
۳۵	۱۹۸۹	ژاپن	بادکنک ماهی (<i>Takifugu niphobles</i>)	<i>Shewanella putrefaciens</i>		
۳۶	۲۰۱۲	تایلند	بادکنک ماهی (<i>Lagocephalus lunaris</i>)			
۱۴	۱۹۹۰	ژاپن	جلبک قرمز (<i>Jania sp.</i>)	<i>Shewanella alga</i> sp. nov.	Oceanospirillaceae	
					Plesiomonaceae	
۲۳	۲۰۰۸	چین	شکم پا (<i>Nassarius semiplicatus</i>)	<i>Marinomonas</i>		
					Alteromonadaceae	
۱۳	۱۹۹۰	ژاپن	رسوبات دریایی	Alteromonas sp.		
۳۷	۱۹۸۹	فیلیپین	اختاپوس (<i>Octopus maculosus</i>)			
۱۴	۱۹۹۰	ژاپن	بادکنک ماهی	<i>Alteromonas tetraodonis</i> sp. nov.		
				Moraxellaceae		
۱۳	۱۹۹۰	ژاپن	رسوبات دریایی	<i>Acinetobacter</i> sp.		
				Caulobacteraceae		
۲۱	۱۹۹۳	ژاپن	رسوبات دریایی	<i>Caulobacter</i> sp.		
				Pasteurellaceae		
۲۵	۱۹۹۵	تایوان	شکم پا (<i>Niotha clathrata</i>)	<i>Pasteurella</i>		
				Moraxellaceae		
۱۳	۱۹۹۰	ژاپن	رسوبات دریایی	<i>Moraxella</i>		
				Alcaligenaceae		
۱۳	۱۹۹۰	ژاپن	رسوبات دریایی	<i>Alcaligenes</i>		
				Pseudoalteromonadaceae		
۱۲	۲۰۱۱	پرتغال	بیوفیلم و آب های شیرین	<i>Pseudoalteromonas</i> sp.		
۳۸	۲۰۰۰	هلند	تونیای دریایی (<i>Meoma ventricosa</i>)			
۱۲	۲۰۱۱	پرتغال	بیوفیلم و آب های شیرین	<i>Pseudoalteromonas marina</i>		
				Rhodobacteraceae		
۳۴	۲۰۰۷	ژاپن	پاروپیان (<i>Pseudocaligus fugu</i>)	<i>Roseobacter</i> sp.		
				Microbacteriaceae		
۳۹	۲۰۰۴	هنگ کنگ	بادکنک ماهی (<i>Takifuguniphobles ovaryof</i>)	<i>Microbacterium arabinogalactanolyticum</i>		
				Micrococcaceae		
۲۱	۱۹۹۳	ژاپن	رسوبات دریایی	<i>Micrococcus</i> sp.		
۱۳	۱۹۹۰	ژاپن	رسوبات دریایی			

رفرانس	سال	کشور	منبع جداسازی	ارگانیسم	شاخص
				<i>Dermacoccaceae</i>	
۴۰	۲۰۱۰	هند	(<i>Arothron hispidus</i>) بادکنک ماهی	<i>Kytococcus sedentarius</i>	
				<i>Cellulomonadaceae</i>	
۴۰	۲۰۱۰	هند	(<i>Arothron hispidus</i>) بادکنک ماهی	<i>Cellulomonas fimi</i>	
				<i>Actinomycetaceae</i>	
۴۱	۱۹۹۱	ژاپن	رسوبات دریابی	<i>Actinomycete sp.</i>	
۴۲	۲۰۰۵	چین	(<i>Fugu rubripes</i>) تخمدان بادکنک ماهی	<i>Nocardiopsis dassonvillei</i>	
				<i>Streptomycetaceae</i>	
۴۱	۱۹۹۱	ژاپن	رسوبات دریابی	<i>Streptomyces sp.</i>	
				<i>Bacillaceae</i>	
۲۱	۱۹۹۳	ژاپن	رسوبات آب شیرین		
۱۳	۱۹۹۰	ژاپن	رسوبات دریابی		
۱۲	۲۰۱۱	پرتغال	(<i>Gibbula umbilicalis</i>) شکم پا	<i>Bacillus sp.</i>	
۳۷	۱۹۸۹	فلیپین	(<i>Octopus maculosus</i>) اختاپوس		
۴۳	۲۰۱۰	چین	(<i>Fugu obscurus</i>) بادکنک ماهی		
۴۴	۲۰۰۹	چین	کبد بادکنک ماهی	<i>Bacillus horikoshii</i>	
۱۲	۲۰۱۱	پرتغال	(<i>Gibbula umbilicalis</i>) شکم پا	<i>Bacillus stratosphericus</i>	
۴۵	۲۰۱۰	چین	(<i>Fugu obscurus</i>) کبد بادکنک ماهی	<i>Lysinibacillus fusiformis</i>	
				<i>Flavobacteriaceae</i>	
۲۱	۱۹۹۳	ژاپن	رسوبات دریابی	<i>Flavobacterium sp.</i>	
۱۳	۱۹۹۰	ژاپن	رسوبات دریابی		
۲۳	۲۰۰۸	چین	(<i>Nassarius semiplicatus</i>) شکم پا	<i>Tenacibaculum</i>	

mekanism-faaliyat-taroud-toxine

VGSCs پروتئین‌های بزرگ جدایی‌ناپذیر غشایی هستند که از یک زیر واحد آلفا (۲۶۰ کیلو دالتون) و یک یا چند زیر واحد کمکی β تشکیل شده‌اند (۴۷). زیر واحد آلفا برای بیان عملکرد، تشکیل منفذ، تعیین خواص بیوفیزیکی کanal کافی است و حاوی فیلتر انتخابی بون می‌باشد (۴۶). زیر واحد‌های بتا می‌توانند صفات وابسته به ولتاژ و حرکت (کیتیک) کanal‌ها را تغییر دهند. از طرفی در محلی سازی کanal‌ها و برهمکنش با مولکول‌های چسبنده سلول، ماتریکس خارج سلولی و اسکلت داخل سلولی نقش ایفا می‌نمایند (۴۸).

۹ ایزوفرم از زیر واحد آلفا در پستانداران شناسایی شده است. این زیر واحدها توسط ژن‌های مختلف کدگذاری می‌شوند و ۹ زیر گروه VGSC را ایجاد می‌کنند می‌شوند و ۹ زیر گروه VGSC را ایجاد می‌کنند (Nav1.1–Nav1.9). یک ایزوفرم ۱۰ (NaX) نیز

جريان یون‌های سدیم به درون سلول‌های عصبی گامی ضروری در انتقال تکانه‌های عصبی در رشته‌های عصبی قابل تحریک و در امتداد آن آکسون است. سلول‌های عادی آکسون، دارای غلظت‌های بالای یون پتانسیم، غلظت‌های پایین یون سدیم و پتانسیل منفی هستند. آکسون با ورود یون‌های سدیم به درون سلول و به دنبال آن تولید یک پتانسیل غشائی مثبت تحریک می‌گردد (۱۸). کanal‌های سدیمی وابسته به ولتاژ (Voltage-gated sodium channels) خانواده (سوپرفامیلی) پروتئین کanal یونی هستند. این کanal‌ها با اجازه دادن به ورود یون‌های سدیم نقش اساسی در عملکرد سلول‌های عصبی و غیرعصبی، شروع و انتشار پتانسیلهای عمل در سلول‌های تحریک‌پذیر ایفا می‌کنند (۴۶).


داروهای ضد صرع (۵۰) می‌باشد. از طرفی، جایگاه اتصالی نیز برای گروههای مختلف نوروتوکسین‌ها دارند که می‌تواند به طور قابل توجهی عملکرد کانال را تغییر دهدن (۵۱).

تetrodotoxin به جایگاه ۱ گیرنده نوروتوکسین در زیرواحد آلفا (درون هشتی بیرونی VGSC) متصل می‌شود. و از آنجایی که TTX بزرگتر از سدیم می‌باشد با مسدود کردن منفذ بیرونی کانال، از ورود یون‌های سدیم جلوگیری می‌کند (شکل ۳). این اتصال مانع از انتشار پتانسیل‌های عمل شده و در نتیجه عملکرد ماهیچه و سلول عصبی فلنج می‌شود (۴۶). تetrodotoxin در مسدود کردن کانال یون سدیم و در نتیجه جریان یون‌های سدیم کاملاً اختصاصی عمل می‌کند. در حالی که تأثیری بر روی یون‌های پتانسیم ندارد (۱۲).


شناسایی شده است که به عنوان یک پروتئین مرتبط عمل می‌کند و VGSC را کد نمی‌کند.

شکل ۲ نمایی شماتیک از زیرواحدهای آلفا می‌باشد. این زیرواحدها پلی پپتیدهای بزرگی هستند که همگی در مجموع از نظر ساختار کلی مشترک هستند. این ساختار دارای ۴ دامنه همولوگ (DI-DIV) می‌باشد. هر دامنه حاوی ۶ قطعه آلفا-مارپیچی Transmembrane (پروتئین غشا سرتاسری) است که توسط لوپ‌های خارج سلولی و داخل سلولی به یکدیگر متصل می‌شوند (۴۶).

توالی‌های اختصاصی اسید آمینه زیر واحد آلفا، دیواره منفذ کانال‌های یونی، حسگر ولتاژ، دریچه غیرفعال و جایگاه‌های فسفوریلاسیون پروتئین را تشکیل می‌دهند (۴۹). همچنین زیر واحد آلفا حاوی جایگاه اتصال برای بی‌حسی موضعی، ضد آریتمی (نامنظمی ضربان قلب) و



شکل ۲) حضور زیرواحدهای آلفا و جایگاه اتصال tetrodotoxin (TTX) در کانال سدیمی واپسیه به ولتاژ از ۴ دامنه همولوگ (DI-IV) تشکیل شده‌اند. هر دامنه شامل ۶ قطعه تراپوسته آلفا هیلیکس است (۶-۱) (قطعه ۴ (قرمز تیره) مربوط به سنسور ولتاژ است. جایگاه‌های فسفوریلاسیون آنزیمهای پروتئین کیناز A (PKA) و پروتئین کیناز C (PKC) به ترتیب با دایره زرد و مریع قهوه‌ای نشان داده شده است. دروازه غیر فعال سریع (موتیف IFM) در لوپ درون سلولی بین دامنه‌های ۳ و ۴ واقع شده است و با حرف H (در بیضی صورتی) مشخص شده است. دوا بر صورتی جایگاه‌های درگیر در تشکیل گیرنده دروازه غیر فعال را نشان می‌دهند. لوپ‌های P بین مارپیچ‌های ۵ و ۶ (به رنگ آبی) واقع شده‌اند و قطعات ore-lining هستند. حلقه‌های خارجی (موتیف EEDD) و داخلی (موتیف DEKA) (به ترتیب با ندهای سبز و بنفش) از اسیدهای آمینه (دایره‌هایی با رنگ‌های یاد شده) تشکیل شده‌اند. مولکول TTX با واحدهای اسید آمینه موجود در این دو حلقه در منفذ کانال، برهمکنش می‌دهد (۴۶).



شکل ۳) ساختار کانال سدیمی وابسته به ولتاژ و محل اتصال تetrodotoxin به آن

به طور اختصاصی، VGSCs‌های حساس و مقاوم به تترودوتوکسین در برخی از انواع سلول‌های موجود در سیستم عصبی مرکزی مانند آستروسیت بیان می‌شوند. علاوه بر این، به نظر می‌رسد که VGSCs‌ها نقش مهمی در عملکرد و زندگی ماندن این سلول‌ها ایفا نمایند. بنابراین، مطالعات بالینی که در آنها TTX و یا عوامل شبیه TTX به سیستم عصبی مرکزی معرفی می‌شوند باید به دقت از نظر تغییر در عملکرد عصبی مورد بررسی قرار گیرند (۴۶).

امروزه VGSC‌ها به دلیل پتانسیل درمانی‌شان بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند. جهش در ژن‌های کد کننده VGSCs (به نام آسیب کانالی) (Channelopathies) به عنوان علت بیماری‌های متعدد ارثی مانند بیماری‌های قلبی، ماهیچه اسکلتی، مغز و اعصاب محیطی شناسایی شده‌اند. علاوه بر این، مشخص شده است که تغییر در بیان ژن‌های غیر جهش یافته VGSC می‌توانند در درمان برخی از اختلالات مانند درد و بیماری مالتیپل اسکلروز (Multiple sclerosis MS) نقش داشته باشند (۵۴).

اهمیت تترودوتوکسین در پزشکی
اگرچه تترودوتوکسین یک سم مهلك و کشنده است، به تازگی مطالعات بسیاری بر روی اثرات بالقوه

۹ زیرگروه VGSC که در پستانداران شناسایی شده است از نظر سیتیک و صفات وابسته به ولتاژ متمایز بوده و در محلی‌سازی بافت‌شان و حساسیت نسبت به TTX متفاوت می‌باشند. غلظت‌های نانومولار از TTX زیر گروه‌های Nav1.1 تا Nav1.6 و Nav1.7 و Nav1.8 (VGSCs) به حساس به TTX (TTX) را بلوک می‌کند. در حالی که غلظت‌های بسیار بالاتر (میکرومولار) از TTX برای بلوک کردن زیر گروه‌های Nav1.5 و Nav1.6 و Nav1.7 (VGSCs) مورد نیاز است (۵۲).


بنابراین، در پستانداران، اثرات فیزیولوژیکی TTX در میان بافت‌های تحريك‌پذیر مختلف بسته به ایزوفرم‌های VGSC بیان شده در سلول‌های شناسایی، متفاوت می‌باشد (۴۶).

نقش‌های عملکردی VGSC‌ها بیکی که توسط سلول‌های عصبی بیان می‌شوند به خوبی مشخص شده است (تشکیل و انتقال پتانسیل‌های عمل). همچنین در بسیاری از سلول‌های غیر عصبی موجود در سیستم عصبی و خارج از سیستم عصبی وجود دارند. با این وجود نقش آنها در اعمال سلولی این سلول‌ها به طور کامل مشخص نشده است (۵۳).

درمان اعتیاد به هروئین است اما به خودی خود می‌تواند اعتیادآور باشد. ادعا می‌شود که تترودین اعتیادآور نیست و در فاز سوم آزمایش‌های بالینی خود قرار دارد (۵۵).

نوسوروگاتوکسین (NSTX) (Neosurugatoxin)

این سم با فرمول شیمیایی $C_{30}H_{34}N_5O_{15}Br \cdot H_2O$ یک ترکیب چند حلقه‌ای است (شکل ۴) که برای اولین بار در سال ۱۹۸۴ توسط تاکو کوشوج (Takuo Kosuge) و همکاران از یک باکتری کورینه فرم موجود در غدد گوارشی نوعی حلزون دریایی شکم پا (بابیلونیا ژاپونیکا)^{۱۷} در ژاپن جداسازی شد (۵۶).



شکل ۴) ساختار شیمیایی نوسوروگاتوکسین. سم تولید شده توسط یک باکتری کورینه فرم دریایی (۵۶).

هایاشی (Hayashi) و همکاران در سال ۱۹۸۴ نشان دادند که این توکسین میل جذبی بالایی برای اتصال به گیرنده‌های نیکوتینی موجود در مغز موش و نیز ایلثوم خوکچه هندی دارد. در حالی که این سم تمایلی به اتصال به گیرنده‌های موسکارینی از خود نشان نداد. به همین دلیل می‌توان گفت که این توکسین یک آنتاگونیست اختصاصی گیرنده‌های استیل کولین نیکوتینی می‌باشد (۵۷).

درمانی و بازاریابی TTX به عنوان دارو انجام شده است. همان‌گونه که قبلًا نیز ذکر گردید تترودوتوكسین یک نوروتوكسین قوی است که کانال سدیم وابسته به ولتاژ (VGSCs) را مسدود می‌نماید. این ویژگی دلیل استفاده از تترودوتوكسین در پزشکی می‌باشد. VGSCs نقش مهمی در عملکرد نورون‌ها در شرایط فیزیولوژیک و پاتولوژیک ایفا می‌کند. TTX به دو گروه کانال‌های اساس حساسیت به TTX تقسیم‌بندی می‌شوند. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که تغییر در بیان و یا عملکرد برخی از VGSCs‌های حساس به TTX در تعدادی از شرایط دردهای مزمن نقش دارند. امروزه تجویز TTX در دوزهای پایین‌تر از آنچه که در تولید و انتقال پتانسیل‌های عمل در سلول‌های عصبی نرمال (غیر آسیب دیده) تداخل ایجاد می‌نمایند، در انسان و حیوانات آزمایشگاهی تحت شرایط درد متفاوت مورد استفاده قرار گفته است. این اطلاعات نقش TTX به عنوان یک عامل درمانی بالقوه برای درد را نشان می‌دهد (۴۶).

بر همین اساس، تترودوتوكسین ممکن است در آینده به منظور اهداف پزشکی مانند مقابله با درد بیماران مبتلا به سرطان، تسکین علایم ترک در معتادان مواد مخدر، استفاده در بیهوشی و پیشگیری از آسیب ایسکمیک مغز و به دنبال آن سکته مغزی مورد استفاده قرار گیرد.

محققان کمپانی WEX دریافت‌هایند که دوز کمی از تترودوتوكسین می‌تواند به عنوان یک مسکن بسیار قوی عمل کند. این شرکت در حال آزمایش یک محصول به نام تترودین^{۱۶} است که مانع از علائم ترک هروئین می‌شود. در حال حاضر متادون رایج‌ترین


^{۱۷} *Babylonia japonica*

^{۱۶} Tetrodin

دارای ۱۱۵ اتم کربن به هم پیوسته و ۶۴ استرئوستر می‌باشد (شکل ۵). PTX یکی از سمی‌ترین و از نظر شیمیایی پیچیده‌ترین توکسین‌های دریایی غیر پروتئینی است که عمدتاً در مرجان‌ها و دینوفلازلات‌ها شناسایی شده است (۵۸).

پالی توکسین (PTX) (Palytoxin)

این توکسین با فرمول شیمیایی $C_{129}H_{223}N_3O_{54}$ برای اولین بار در سال ۱۹۷۱ از یک مرجان (Zoanthid) به نام پالی توا توکسیکا (*Palythoa toxica*) جداسازی گردید. PTX یک مولکول پلی‌کتابد پیچیده است که



شکل ۵) ساختار شیمیایی پالی توکسین (۶)

جنس‌های بروی باکتریوم (*Brevibacterium*) و اسیتوبکتر در این موجودات دریایی تأیید گردید (۵۸).


مکانیسم فعالیت پالی توکسین

پمپ سدیم - پتاسیم ATPase عضوی از پروتئین‌ترایپوسته‌ای ATPases P-type است که کاتالیز (تسريع) کننده انتقال کاتیون‌ها می‌باشد (۶۰). این پمپ نقش مهمی در انتقال سه یون سدیم از درون سلول به فضای خارج سلولی و نیز وارد کردن دو یون پتاسیم به سیتوزول سلول ایفا می‌کند (شکل ۶). این انتقال با صرف یک مولکول ATP انجام می‌شود (۶۱). این پمپ بر روی سطح سلول هر مهره‌داری

پیشنهاد منشاء باکتریایی این توکسین در سال ۲۰۰۰ توسط فرولوا (Frolova) و همکاران با بررسی نمونه‌های سمی پالی توا مطرح گردید. نتایج آنها نشان داد که باکتری‌های گرم منفی آروموناس و ویبریو تولید کننده ترکیباتی بودند که از نظر آنتی ژنی مربوط به PTX بودند (۵۹). پس از آن سیمن (Seemann) و همکاران در سال ۲۰۰۹ در مطالعه دیگری که با هدف ارزیابی منشاء باکتریایی PTX در دو گونه مرجانی (پالی توا کریباژروم (*Palythoa caribaeorum*) و زوانتوس پالچلوس (*Zoanthus pulchellus zoanthid*)) و یک گونه اسفنج انجام گرفت، حضور باسیلوس سرئوس و

می باشد (۶۲).

وجود دارد و برای زیست‌پذیری تمام سلول‌ها لازم



شکل ۶) مکانیسم عمل پالی‌توكسین. سمت چپ: عملکرد طبیعی پمپ سدیم، پتاسیم-ATPase را در سلول نشان می‌دهد. این عمل شامل انتقال فعال (در جهت شب غلط) ۳ یون سدیم از داخل به خارج از سلول و وارد کردن ۲ یون پتاسیم به داخل سلول می‌باشد. سمت راست: اتصال یک مولکول پالی‌توكسین به بخش خارجی زیر واحد آلفا از پمپ سدیم، پتاسیم-ATPase موجب تبدیل پمپ به یک کانال کاتیونی می‌گردد. در نتیجه یون‌های سدیم وارد سلول شده و یون‌های پتاسیم از داخل سلول به خارج هدایت می‌شوند (۶۱).

شیرین در سرتاسر دنیا هستند (۶۴). سیانوバکتریا ترکیبات فعال زیستی بسیار متنوعی را تولید می‌کنند. از این میان می‌توان به ترکیباتی با فعالیت ضد سرطانی و ضد ویروسی، محافظت کننده از اشعه UV، مهارکننده‌های اختصاصی آنزیم‌ها و هپاتوتوكسین‌ها و نوروتوكسین‌ها اشاره نمود (۶۵).

توكسین‌های سیانوバکتریایی سموم طبیعی تولیدی ذخیره شده در سلول‌های گونه‌های معین سیانوバکترها است. از نقطه نظر توکسیکولژیکی، سیانوتوکسین‌ها در محدوده چهار دسته اصلی قرار می‌گیرند: نوروتوكسین‌ها، هپاتوتوكسین‌ها، سیتوتوکسین‌ها، و درماتوتوكسین‌ها (توكسین‌های محرک) (۶۶). با این وجود، سیانوتوکسین‌ها از نظر ساختاری کاملاً متنوع می‌باشند.

در دهه گذشته، مسیرهای بیوسنتر چهار سیانوتوکسین اصلی شامل میکروسیستین، نودولارین، ساکسی توكسین

سمیت پالی‌توكسین به دلیل میل اتصالی بسیار بالای آن به بخش خارج سلولی زیر واحد آلفا پمپ سدیم - پتاسیم ATPase می‌باشد. این امر موجب تشکیل یک منفذ (کانال) کاتیونی نسبتاً غیرانتخابی در درون و یا نزدیک پمپ پروتئینی می‌گردد (۶۲ و ۶۱). پالی‌توكسین اولین ترکیب سمی است که باعث تشکیل کانال می‌شود. این امر موجب می‌شود که یون‌های تک ظرفیتی مثبت مانند سدیم و پتاسیم در خلاف شب غلط آزادانه انتشار یابند و در نتیجه گرادیانت یونی سلول تخریب گردد (۶۱). در حالت عادی حدود ۱۰۰ یون از طریق این کانال عبور داده می‌شود. اما با حضور PTX در هر ثانیه میلیون‌ها یون از کانال منتشر می‌شوند (۶۳) (شکل ۶).

توكسین‌های سیانوバکتری‌ها

سیانوバکتری‌ها (جلبک‌های سبز - آبی) اعضا معمول فیتوپلانکتون‌های آب‌های دریایی، لب شور و آب

سیلیندروسپرموپسین یک سیتو توکسین آکالولئیدی هیدروفیلی است که از گونه‌های مختلف سیانوباکتری‌های آب شیرین مانند سیلیندروسپرموپسین راکی بورسکی^{۱۹}، آمیزاكیا ناتانس^{۲۰}، آفانیزومنون اووالیسپوروم^{۲۱}، آنانبا اس پی.^{۲۲} و رافیدیوپسیس اس پی.^{۲۳} جداسازی شده است. سوموم محرك سیانوباکتری‌های آب شیرین مانند لیپوپلی ساکارید (LPS) یا اندوتوكسین‌ها اجزای اصلی دیواره سلولی در بیشتر باکتری‌های گرم منفی از جمله سیانوباکتری‌ها می‌باشند (۶۸).

نحوه اثر توکسین‌های سیانوباکتریایی

نوروتوكسین‌ها الف) آناتوكسین a

این سم با فرمول شیمیایی $C_{10}H_{15}NO$ یک آکالولئید آمینی دو حلقه‌ای است که به نام عامل کشنده بسیار سریع (VFDF)^{۲۴} نیز شناخته شده است (شکل ۷). آناتوكسین a برای اولین بار در اوایل دهه ۱۹۶۰ از دریاچه ساسکاچوان^{۲۵} در کانادا جداسازی شد و پس از آن در سال ۱۹۷۲ در سیانوباکتری آنانبا فلاس اکوا^{۲۶} گزارش گردید (۷۱).

آناتوكسین a در شرایط درون تن (in vivo) به وسیله گونه آنانبا فلاس اکوا و چندین جنس دیگر سیانوباکتری ستتر می‌گردد. این توکسین و ساختارهای شیمیایی مربوط به آن با استفاده از استاتات و گلوتامات تولید می‌گردد. احیا بیشتر آنزیمی این پیش‌سازها موجب تشکیل آناتوكسین a می‌شود (۷۲).

آناتوكسین a، آناتوكسین S(a) و سیلیندروسپرموپسین^{۱۸} از لحاظ ژنتیکی و بیوشیمیایی مشخص شده‌اند (۶۴). این ترکیبات به طور عمده باعث آلدگی آب‌های آشامیدنی می‌شوند. با این وجود، حضور این توکسین‌ها در آبهای شیرین و نرم‌تنان دریایی نیز شناسایی شده است (۶۷).

این سوموم بر اساس اندام‌های هدف به ۴ خانواده طبقه‌بندی می‌شوند: نوروتوكسین (سیستم عصبی)، هپاتوتوكسین (کبد)، سیتو توکسین (اندام‌های کبد، کلیه، غدد آدرنال، روده کوچک) و (سوموم محرك) (۶۸). نوروتوكسین‌های سیانوباکتریایی به سه گروه آناتوكسین‌ها (آناتوكسین a، هومو آناتوكسین a و آناتوكسین a (S)), ساکسی توکسین‌ها و اسید آمینه نوروتوكسیک L- بتا - N- متیل آمینو - L- آلانین (BMAA) تقسیم می‌شوند. از این میان آناتوكسین‌ها و BMAA، مختص سیانوباکتری‌ها هستند. در حالی که ساکسی توکسین‌ها توسط برخی از داینوفلازلاهای دریایی نیز ستتر می‌شوند. برخلاف نوروتوكسین‌هایی که تولیدشان وابسته به فیلوژنی گونه‌ها است، BMAA می‌تواند توسط تقریباً تمام گروه‌های سیانوباکتری موجود در آب شیرین، لب سور و محیط‌های دریایی تولید گردد (۶۹).

هپاتوتوكسین‌ها به دو گروه میکروسیستین (MCS) و نورولارین تقسیم می‌شوند. میکروسیستین یک هپتاپتید حلقوی است که به عنوان فراوان‌ترین سیانوتوكسین تولیدی با توزیع گسترده جهانی شناخته می‌شود. در حال حاضر بیش از ۸۰ واریانت MC گزارش شده است (۷۰). نودولارین از پنج اسید آمینه تشکیل شده است که تنها دارای ۹ آنالوگ طبیعی مختلف می‌باشد.

¹⁹ *Cylindrospermopsis raciborskii*

²⁰ *Umezakia natans*

²¹ *Aphanizomenon ovalisporum*

²² *Anabaena* sp.



²³ *Raphidiopsis* sp.

²⁴ Very Fast Death Factor

²⁵ Saskatchewan

²⁶ *Anabaena flos aquae*


¹⁸ *Cylindrospermopsis*



شکل ۷) ساختار شیمیایی آناتوکسین a. سم عصبی تولید شده توسط چندین گونه سیانوباکتریایی (۷۲)

موجب دپلاریزاسیون سلول و القای پتانسیل عمل و در نتیجه انقباض عضله گردند. پس از آن انتقال دهنده عصبی استیل کولین از گیرنده سیستم عصبی جدا می شود و توسط آنزیم استیل کولین استراز به سرعت به استات و کولین تجزیه می گردد (شکل ۸) (۷۳).

در شرایط عادی، استیل کولین به گیرنده های عصبی موجود در غشای نورون پس سیناپسی متصل می شود. این امر موجب تغییر ساختار فضایی در دامنه خارج سلولی گیرنده ای می شود که باز کننده منافذ کanal می باشد. این کanal به یون های سدیم و کلسیم اجازه می دهد تا به درون سلول های عصبی وارد شوند و



شکل ۸) مقایسه وضعیت ماهیچه در حالت عادی و در حالت فعالیت آناتوکسین a.



عصبی مرکزی می باشد (۷۲). تمایل آناتوکسین a برای اتصال به این گیرنده ها حدود ۲۰ برابر استیل کولین

آناتوکسین a آگونیست گیرنده های عصبی و گیرنده های استیل کولین نیکوتینی موجود در سیستم

استفاده قرار می‌گیرد. امروزه تحقیقات بیشتر بر روی آناتوکسین a و دیگر آنالوگ‌های ضعیفتر آن به عنوان جایگزین‌های احتمالی استیل کولین انجام شده است (۷۱).

b) هو موآنا تو کسین

این سم یک آگونیست نیکوتینی قوی است که همولوگی از آناتوکسین a می‌باشد. هومو آناتوکسین a به وسیله سیانوباکتری رشته‌ای آسیلاتوریا فورموسا (Oscillatoria formosa) تولید می‌شود و دارای پیش سازه‌ای مشابه آناتوکسین a می‌باشد. با این وجود، هومو آناتوکسین a توسط S-آدنوزیل-L-متیونین به جای یک الکترون اضافی دارای یک گروه متیل دیگر می‌شود. در نتیجه یک آنالوگ مشابه ایجاد می‌گردد (شکل ۹).



شکل ۹) شیاهت ساختاری آناتوکسین a و هومو آناتوکسین a (۷۲).

این نوروتوكسین موجب افزایش رهایش استیل کولین از اعصاب کولینرژیک (هر سلول عصبی که توانایی ایجاد، تغییر و یا آزادکردن استیل کولین را دارد) محیطی می‌گردد. این عمل از طریق باز شدن ولتاژ درونی کانال‌های کلسیم نوع L عصبی انجام می‌گذد.(۷۶)

ج) آنا تو کسین (s) a



این توکسین با وجود شباهتی که در نام با آنا توکسین a دارد، اما از نظر ساختاری مشابه یکدیگر نیستند و

می باشد (۷۱). این در حالی است که سیانو توکسین اثر کمی بر روی گیرنده های استیل کولین موسکارینی دارد (۷۴). آناتوکسین a، گیرنده های استیل کولین نیکوتینی را در محل اتصال عصبی عضلانی تحت تأثیر قرار می دهد (۷۵). این توکسین به گیرنده های یاد شده متصل می شود و موجب اثرات مشابه در سلول های عصبی می گردد. با این تفاوت که اتصال آناتوکسین a به گیرنده ها غیر قابل برگشت می باشد و این کمپلکس توسط آنزیم استیل کولین استراز شکسته نمی شود (شکل ۸). بنابراین، گیرنده سیستم عصبی به طور موقت باز شده و پس از یک دوره زمانی، حساسیت خود را از دست می دهد. در این حالت، گیرنده دیگر اجازه عبور کاتیون ها را صادر نمی کند و در نهایت انتقال ماهیچه های عصبی مسدود و عضلات از کار می افتدند (فلج می شوند) (۷۶ و ۷۴). ایست تنفسی ناشی از عدم عرضه اکسیژن به مغز، آشکارترین اثر کشنده آناتوکسین a می باشد (۶۸ و ۷۴).

نشان داده است که تزریق دوز کشنده آناتوکسین a به موش، رت، پرندگان، سگ و گوساله موجب مرگ با عالیم دنبالهای شامل فاسیکولاسیون عضلانی، کاهش حرکت، کلپس، تنفس بیش از حد شکمی، سیانوز و تشنیج می شود (۷۱).

استفاده پزشکی آناتوکسین a

آناتوکسین a یک آگونیست بسیار قدرتمند گیرنده استیل کولین نیکوتینی است و به طور گسترده به منظور اهداف دارویی مورد مطالعه قرار گرفته است. این توکسین عمدتاً به عنوان کاوشگر دارویی در راستای بررسی بیماری‌هایی که با سطوح پایین استیل کولین توصیف می‌شوند مانند دیستروفی عضلانی، میاستنیا گراویس، بیماری آزوپیر و پارکینسون مورد




شکل (۱۱) ساختار شیمیایی ساکسین، سم عصبی تولید شده
توسط چندین گونه سیانو باکتریایی (۱۰)

ساکسین توکسین، محلول در آب و پایدار در مقابل حرارت بوده و به عنوان یکی از قوی‌ترین توکسین‌های طبیعی انسانی شناخته می‌شود. این سم عصبی مسدود کننده انتخابی کانال سدیم می‌باشد. ساکسین توکسین کانال‌های سدیمی وابسته به ولتاژ را در سلول‌های عصبی تحت تأثیر قرار می‌دهد و از عملکرد طبیعی سلولی جلوگیری می‌نماید و در نهایت موجب فلجه شدن می‌گردد (۷۹). کانال سدیمی وابسته به ولتاژ برای عملکرد طبیعی سلول‌های عصبی ضروری است. این کانال‌ها به صورت پروتئین‌های غشای جدایی ناپذیر (integral) در طول آکسون یک سلول عصبی پراکنده هستند و دارای چهار دامنه می‌باشند که در سرتاسر غشای سلولی گسترش یافته‌اند. باز شدن این کانال‌ها وابسته به تغییر در ولتاژ و یا برخی از اتصالات صحیح لیگاندی می‌باشد. این شرایط برای عملکرد صحیح کانال‌های سدیمی در درجه اول اهمیت قرار دارند. زیرا این کانال‌ها برای گسترش پتانسیل عمل ضروری می‌باشند (۴۶).

بدون این توانایی، سلول‌های عصبی قادر به انتقال سیگنال‌ها نیستند و سیستم عصبی از منطقه‌ای از بدن که وابسته به تحريك توسط انرژی عصبی است قطع شدن منطقه تحت تأثیر قرار گرفته می‌شود. موارد یاد شده در مورد ساکسین توکسین صدق می‌نمایند.

صفات فیزیولوژیکی متفاوتی از خود نشان می‌دهند. آناتوكسین a (S) متعلق به کلاس ارگانوفسفات بوده و از نوروتوكسین‌ها می‌باشد و به عنوان یک مهار کننده برگشت‌ناپذیر آنزیم استیل کولین استراز در سیناپس‌های عصبی عمل می‌کند (شکل (۱۰)) (۷۷).



شکل (۱۰) مکانیسم اثر آناتوكسین a (S) (۱۰)

د) ساکسین توکسین (Saxitoxin)


این توکسین تتراهیدروپورینی با فرمول شیمیایی $C_{10}H_{17}N_7O_4$ ^{۲۷} برای اولین بار از نوعی صدف کره‌ای ^{۲۸} گونه آلاسکایی ساکسیدوموس گیگانتوس جداسازی گردید. به همین دلیل نام STX به آن داده شد. ساختارهای بنیادی این توکسین‌ها از سیستم‌های سه حلقه‌ای ۳ و ۴ - پروپینوپرہیدروپورین پیروی می‌کنند (شکل (۱۱)) (۷۸).

^{۲۷} Butter clam


^{۲۸} *Saxidomus giganteus*

شده را مسدود می‌کند و از جریان یافتن یون‌های سدیم در طول غشاء جلوگیری به عمل می‌آورد. این وقایع همانطور که در بالا ذکر گردید موجب خاموش شدن سیستم عصبی می‌گردد (شکل ۷۸ و ۷۹).

به طوری که ساکسی توکسین به صورت برگشت‌پذیر به جایگاه ۱ زیر واحد آلفا در کanal‌های سدیمی وابسته به ولتاژ متصل می‌گردد (شکل ۱۲). این توکسین به طور مستقیم به منفذ کanal پروتئینی متصل می‌شود، کanal باز



شکل ۱۲) محل اتصال ساکسی توکسین به جایگاه ۱ زیر واحد آلفا در کanal سدیمی وابسته به ولتاژ



شکل ۱۳) مکانیسم اثر ساکسی توکسین. بلوکه کردن کanal‌های سدیمی و کلسیمی در سلول‌های عصبی (۱۰)


به نوعی خود می‌تواند منجر به تغییر در ورود یون‌ها به سلول شود (۸۱). علاوه بر این انسداد کanal سدیم ممکن است خاصیت نفوذ‌پذیری انتخابی غشاء و در

ساکسی توکسین‌ها همچنین می‌توانند به کanal‌های کلسیمی نیز متصل شوند و در سرعت باز و بسته شدن این کanal‌ها تداخل ایجاد نمایند (شکل ۱۳). این امر

BMAA می‌تواند در پروتئین‌های در حال ساخت به جای L-سرین قرار گیرد. این امر ممکن است موجب تاخوردگی اشتباه پروتئین و تجمع آن گردد. هر دو این وقایع از نشانه‌های بیماری‌های tangle مانند آلزایمر، پارکینسون، تصلب جانبی آمیوتروفیک (ALS)^{۲۹}، فلچ فرا هسته‌ای پیش رونده (PSP)^{۳۰} و بیماری لوی^{۳۱} می‌باشد. مطالعات آزمایشگاهی نشان داده است که تداخل BMAA در پروتئین سازی می‌تواند در حضور بیش از حد L-سرین مهار گردد (۸۴).

و) کالکی توکسین (KTX) (Kalkitoxin)

این توکسین یک تیازولین لیپوپیتید است که اولین بار در سال ۱۹۹۹ توسط یک سیانوباکتری دریایی به نام لینگبیا مجسکول^{۳۲} (*Lyngbya majuscule*) در مناطق گرم‌سیری تولید شده است (شکل ۱۵) (۸۵). مطالعات نشان داده که این سم قادر به القاء سمیت عصبی تأخیری در نورون‌های گرانول مخچه موش می‌باشد. با توجه به افزایش مهار کلسیم القا شده توسط وراتریدین در این سلول‌ها، عقیده بر این است که این سم مسدود کننده کانال‌های Nav می‌باشد (۸۶). با این وجود، جایگاه مولکولی دقیق برهمکنش کالکی توکسین و کانال‌های Nav ناشناخته مانده است (۴۷).




شکل ۱۵) ساختار شیمیایی کالکی توکسین (KTX)، سم عصبی تولید شده توسط سیانوباکتری لینگبیا مجسکول (۷۲)

نتیجه جریان یون‌ها را تغییر دهد. این امر باعث آسیب رسانی به هموستانز سلولی می‌گردد (۸۲).

ه) اسید آمینه نوروتوكسیک (BMAA)

این توکسین با فرمول شیمیایی $C_4H_{10}N_2O_2$ ، یک اسید آمینه غیر پروتئینوژنیک است که توسط سیانوباکتری‌ها تولید می‌گردد. این توکسین مشتقی از اسید آمینه آلانین است که یک گروه متیل آمینو در زنجیره جانبی آن قرار گرفته است (شکل ۱۴).



شکل ۱۴) ساختار شیمیایی اسید آمینه نوروتوكسیک (BMAA)، سم عصبی تولید شده توسط چندین گونه سیانوباکتریایی (۷۲)

اگرچه مکانیسم دقیق اختلال در نورون حرکتی و مرگ ایجاد شده به وسیله BMAA به طور کامل شناخته نشده است، اما مطالعات مختلف مکانیسم‌های متعدد اثرگذاری این توکسین را نشان می‌دهند.

BMAA می‌تواند در پستانداران به عنوان آگونیست گلوتامات در گیرنده‌های AMPA (آلفا-آمینو-۳-هیدروکسی-۵-متیل-۴-ایزوکسانول پروپیونیک اسید) وابسته به کلسیم، کائینیت (kainite) و NMDA (N-متیل-D-آسپارتات) عمل نماید. در نتیجه این امر، غلظت درون سلولی کلسیم در سلول‌های عصبی افزایش می‌یابد و فعالیت عصبی به طور بی‌رویه‌ای القا می‌گردد (۸۸).

عقیده بر این است که فعال شدن گیرنده گلوتامات متابوتروپیک ۵ موجب القا فشار اکسیداتیو در نورون‌ها از طریق تخلیه گلوتاتیون می‌گردد (۸۳).

²⁹ Amyotrophic lateral sclerosis

³⁰ Progressive supranuclear palsy

³¹ Lewy

³² *Lyngbya majuscule*

گذشته از اثرات سمی، به نظر می‌رسد که ATX موجب افزایش بروز رشدی آکسون در سلول‌های عصبی نابالغ در حال توسعه، وابستگی به ورود سدیم، فعالیت گیرنده NMDA، کانال‌های کلسیم وابسته به ولتاژ و مسیر کالمودولین کیناز می‌گردد (۹۱).

هپا توکسین‌ها

الف) میکروسیستین - LR

میکروسیستین‌ها با فرمول شیمیایی $C_{49}H_{74}N_{10}O_{12}$ هپتاپپتیدهای حلقوی می‌باشند که در آب بسیار پایدار بوده و در برابر هیدرولیز و اکسیداسیون مقاوم می‌باشند. نیمه عمر این سم در pH برابر ۱ و دمای ۴۰ درجه سلسیوس، معادل ۳ هفته است (۹۲).


هفت اسید آمینه‌ای که در ساختار یک میکروسیستین قرار دارند شامل یک اسید آمینه β -منحصر به فرد -D-آلانین، -D- β -متیل-ایزوآسپارتات و -D-گلوتامیک اسید می‌باشند. علاوه بر این، میکروسیستین‌ها حاوی دو واحد متغیر نیز هستند که باعث تمایز بین واریانت‌های مختلف میکروسیستین‌ها می‌شوند. این دو عنصر متغیر همیشه اسیدهای آمینه استاندار نوع L می‌باشند. به طوری که در میکروسیستین -LR این اسیدهای آمینه از نوع لوسین و آرژنین می‌باشند (شکل ۱۷).

میکروسیستین‌ها رایج‌ترین هپا توکسین‌ها تولید شده توسط سیانوباکتری‌ها می‌باشند. میکروسیستین -LR، به طور کلی فاقد خاصیت نفوذ به غشاء سلول‌های مهره‌داران می‌باشند. بنابراین، برای نفوذ نیازمند جذب از طریق سیستم انتقال اسیدهای صفوایی موجود در سلول‌های کبدی و سلول‌های پوشاننده روده کوچک می‌باشند. به همین دلیل، سمیت این سیانو توکسین تنها به اندام‌هایی محدود می‌گردد که

ز) آنتیلاتوکسین (ATX) (Antillatoxin)

این توکسین با فرمول شیمیایی $C_{28}H_{45}N_3O_5$ یک نوروتوكسین لیپوپپتیدی قوی غیرمعمول است که توسط یک سیانوباکتری دریایی به نام لینگبیا مجسکیول تولید می‌گردد (شکل ۱۶) (۸۷).

با استفاده از روش NMR مشخص گردید که این سم حاوی یک تری پپتید به نام گلیسین -N-متیل والین -آلانین، یک هیدروکسی کربوکسیلیک اسید و یک t-9 بوتیل -۶،-۸-دی متیل -۶،-۸-دین (diene) متصل شده به کرین ۵ اسکلت پپتیدی حلقوی می‌باشد (۸۸).



شکل ۱۶) ساختار شیمیایی آنتیلاتوکسین (ATX)، سم عصبی تولید شده توسط سیانوباکتری لینگبیا مجسکیول (۸۷)

Zirroحد آلفا کانال‌های سدیمی وابسته به ولتاژ را فعال می‌کند (۸۹). این امر می‌تواند موجب افزایش ورود سدیم به داخل سلول، دیلاریزاسیون سلولی، بیش فعالی گیرنده NMDA (N-متیل -D-آسپارتیک اسید)، افراط در ورود کلسیم و نکروز سلول‌های عصبی شود (۸۷). عقیده بر این است که ATX این کار را از طریق تغییر در ویژگی کانال‌های وابسته به ولتاژ انجام می‌دهد.

با توجه به مطالب قبلی که در مورد مکانیسم فعالیت سایر سمهای سیانوباکتریی ذکر گردید، قابل قبول به نظر می‌رسد که با استفاده از تترودو توکسین و یا آنتاگونیست گیرنده NMDA می‌توان از این سمیت سلولی جلوگیری نمود؛ به شرطی که در مراحل اولیه برخورد با ATX تجویز شوند (۹۰).


با وجود مکانیسم یاد شده، به تازگی مشخص شده است که میکروسیستین نه تنها با مهار مستقیم فعالیت پروتئین فسفاتاز نوع 2A، تعديل کننده بیان آن نیز می‌باشد. به آنژیم است بلکه تنظیم کننده بیان آن نیز می‌باشد. به همین دلیل به نظر می‌رسد که مکانیسم‌های سمیت میکروسیستین‌ها پیچیده‌تر از آنچه انتظار آن می‌رفت، باشد.

القای برخی از مکانیسم‌های سلولی - مولکولی به نظر می‌رسد که وابسته به زمان و غلظت میکروسیستین و در بیشتر موارد مربوط به تشکیل ROS^{۳۴} باشد. این سطوح درون سلولی ROS باعث استرس اکسیداتیو، تغییر در چندین مارکر استرس اکسیداتیو القا شده توسط میکروسیستین - LR و در نهایت آپوپتوز یا آسیب سلولی و نیز سمیت ژنی^{۳۵} می‌گردد. از طرفی میکروسیستین می‌تواند القا کننده چندین تغییر در عناصر اسکلت سلولی مانند ریزرشته‌ها، رشته‌های حد واسط و میکروتوبولوها باشد. این امر منجر به تغییر در معماری اسکلت سلولی و زیست‌پذیری سلول می‌شود. همچنین نشانه‌هایی مبنی بر نقش بیام رسان‌های ثانویه در سمیت سلولی^{۳۶} و آپوپتوز ایجاد شده توسط میکروسیستین - LR وجود دارد. آنالوگ‌های مختلف این توکسین‌ها، درجات متفاوتی از پاسخ‌های سلولی به ظرفیت درونی سم، میل جذبی به سمت PP1 و PP2A و توانایی ایجاد استرس اکسیداتیو را القا می‌کنند (۹۵).

ب) نودولارین (Nodularin)

این هپاتوتوكسین با فرمول شیمیایی C₄₁H₆₀N₈O₁₀ یک پتایپتید حلقوی غیر ریبوزومی است که حاوی چند اسید آمینه غیر پروتئینزیک غیر معمول مانند

مانند کبد بیان کننده انتقال دهنده (ترانسپورتر) آئیونی آلی بر روی غشای سلولی خود باشند (۹۳).



شکل ۱۷) ساختار شیمیایی میکروسیستین - LR هپاتوتوكسین تولید شده توسط سیانوبکتری‌ها

میکروسیستین - LR، فعالیت آنژیمی پروتئین فسفاتازهای نوع ۱ و نوع 2A (PP2A و PP1) را در سیتوپلاسم سلول‌های کبدی مهار می‌کنند. این امر منجر به افزایش فسفوریلاسیون پروتئین‌ها در سلول‌های کبدی می‌گردد. برهمکنش بین میکروسیستین - LR و فسفاتازها با تشکیل یک پیوند کووالانسی بین گروه متیلن میکروسیستین - LR و واحد سیستین در زیر واحد کاتالیتیکی فسفوپروتئین فسفاتاز (PPP)^{۳۳} خانواده سرین / ترؤنین مخصوص فسفاتاز، مانند PP1 و PP2A انجام می‌شود. هنگامی که میکروسیستین - LR به طور مستقیم به مرکز کاتالیزوری آنژیم‌های PPP متصل می‌شود، به طور کامل از دسترسی سویسترا به جایگاه فعل آنژیم جلوگیری می‌نماید. در نتیجه فعالیت آنژیم پروتئین فسفاتاز مهار می‌شود و پروتئین‌های فسفریله بیشتری سلول‌های کبدی را ترک می‌کنند. این رویداد مسئول سمیت کبدی میکروسیستین - LR می‌باشد (۹۴).

^{۳۴} Reactive Oxygen Species


^{۳۵} Genotoxicity

^{۳۶} Cytotoxicity

^{۳۳} Phospho Protein Phosphatase

و به صورت کووالانسی ساختار DNA و یا RNA را تغییر می‌دهد.


CYN اولین بار در سال ۱۹۷۹ پس از شیوع یک بیماری مرموز در جزیره پالم کوئینزلند، استرالیا کشف گردید. شیوع این بیماری مربوط به شکوفایی (بلوم) یک گونه سیانوباکتریایی به نام سیلیندروسپرموپسین راکی بورسکی در مناطق تأمین کننده آب آشامیدنی بود (۹۸).



شکل ۱۹) ساختار شیمیایی سیلیندروسپرموپسین آalkالوئید (CYN).
سیتوتوکسین تولید شده توسط سیانوباکتری ها (۹۹)

در سال ۱۹۹۲ تجزیه و تحلیل توکسین منجر به شناسایی ساختار شیمیایی آن گردید. با این وجود، این ساختار در سال ۲۰۰۰ پس از سنتز آزمایشگاهی مورد بازبینی مجدد قرار گرفت (۹۹). تغییرات پاتولوژیک مرتبط با مسمومیت CYN در چهار مرحله مجزا گزارش شده است: مهار سنتز پروتئین، گسترش^{۳۹} غشاء، تجمع چربی درون سلول‌ها و در نهایت مرگ. بررسی کبد موش نشان داد که در تزریق داخل صفاقی CYN، پس از ۱۶ ساعت ریبوزوم‌ها از شبکه اندوپلاسمی خشن (RER) جدا می‌شوند. در ۲۴ ساعت، از دیاد سیستم‌های غشایی شبکه اندوپلاسمی صاف (SER) و دستگاه گلزی رخ می‌دهد. در ۴۸ ساعت، قطرات کوچک چربی در سلول‌های بدن انباسته می‌شوند و در ۱۰۰

اسید N-متیل-D-دهیدرو آمینو بوتیریک اسید و آمینو اسید ADDA می‌باشد (شکل ۱۸).



شکل ۱۸) ساختار شیمیایی نودولارین، هپاتوتوكسین تولید شده توسط سیانوباکتری ها (۹۶)

نودولارین توسط یک گونه پلانکتونی سیانوباکتری به نام نودولاریا اسپامیجنا^{۳۷} و نیز توسط گونه کفزی سیانوباکتریایی نودولاریا اسفلوروکارپا PCC7804^{۳۸} تولید می‌گردد (۹۶). نودولارین نیز مانند میکروسیستین قادر به مهار آنزیم پروتئین فسفاتاز ۱ و ۲A و نیز القاء هایپر فسفوریلاسیون پروتئین، کلایپس اسکلت سلولی و خونریزی شدید کبد می‌باشد (۹۶).

سیتوتوکسین

سیلیندروسپرموپسین آalkالوئید (CYN)

این توکسین با فرمول شیمیایی C₁₅H₂₁N₅O₅S به عنوان یک سیتوتوکسین عمومی شناخته شده که سنتز پروتئین را در سلول‌های پستانداران مسدود می‌نماید (۹۷). این مولکول دارای یک گروه گوانیدین سه حلقه‌ای و یک حلقه اوراسیل می‌باشد (شکل ۱۹).

سیلیندروسپرموپسین توسط انواع سیانوباکتری‌های آب شیرین تولید می‌شود. CYN برای بافت‌های کبد و کلیه سمی است و سنتز پروتئین را مهار کرده

³⁷ *Nodularia spumigena*

³⁸ *Nodularia sphaerocarpa* PCC7804

توكسین‌های در یکی از گروه‌های نوروتوكسین، هپاتوتوكسین و سیتوتوكسین قرار دارند. این توكسین‌ها از طریق انسداد کانال‌های سدیمی در سلول‌های عصبی، آگونیست گیرنده‌های استیل کولین، مهار پمپ‌های غشایی، مهار فعالیت آنزیمی پروتئین فسفاتازهای نوع ۱ و ۲A و مهار سنتز پروتئین نقش عملکردی خود را ایفا می‌نمایند. شواهد به دست آمده از مطالعات پیشین نشان می‌دهد که آگاهی از ساختار شیمیایی و مکانیسم عمل این توكسین‌ها می‌تواند ابزار مفیدی در طراحی داروهای جدید، درمان بیماری‌ها و نیز مبارزه با بیماری‌زایی آنها باشد.

سپاس و قدردانی

نویسنده‌گان این مقاله از تمام پژوهشگرانی که در سرتاسر جهان و کشور عزیزمان نتایج مطالعه‌شان به ارائه این مقاله منجر گردید و به دلیل محدودیت‌های مقاله امکان استناد به تمامی آنها وجود نداشته است کمال امتنان را دارند.

تضاد منافع

هیچ‌گونه تعارض منافع توسط نویسنده‌گان بیان نشده است.

References:

- 1.Nabipour I, Najafi A, Bolkheir A. Anticancer and cytotoxic compounds from seashells of the Persian Gulf. Iran South Med J 2009; 12: 231-7. (Persian)
- 2.Subramani R, Aalbersberg W. Marine actinomycetes: An ongoing source of novel bioactive metabolites. Microbiol Res 2012; 167: 571-80.
- 3.Mohebbi Gh, Nabipour I, Vazirizadeh A. The Sea, the Future Pharmacy. Iran South Med J 2014; 17: 748-88. (Persian)
- 4.Nazarian M, Nabipour I, Najafi A. Marine actinobacteria: a source for discovering of new drugs. J Microbial World 2015; 8: 76-92.
- 5.Agrawa A, Gopal K. Microbial Toxicity Studies. In: Biomonitoring of Water and Waste Water. India: Springer, 2012, 121-33.

ساعت، سلول‌های کبدی در لوبول کبدی تخریب می‌شوند (۱۰۰).

فرآیند مهار سنتز پروتئین توسط CYN غیر قابل برگشت می‌باشد؛ اما مکانیسم قطعی اثرگذاری این سیتوتوكسین نمی‌باشد. فراسیو (Froscio) و همکاران پیشنهاد کردند که CYN حداقل دارای دو مکانیسم فعالیت جداگانه می‌باشد: یکی مهار سنتز پروتئین و دیگری روشنی نامشخص که باعث مرگ سلولی می‌شود. زیرا مشخص شده است که سلول‌ها می‌توانند برای مدت طولانی (تا ۲۰ ساعت) در حالی که ۹۰ درصد سنتز پروتئین‌شان مهار شده، زنده باقی بمانند (۱۰۱).

با توجه به ساختار CYN (شامل گروه‌های سولفات، گوانیدین و اوراسیل) گفته می‌شود که این توكسین می‌تواند DNA یا RNA را نیز تحت تأثیر قرار دهد. یافته‌های شوو (Shaw) و همکاران نشان دهنده اتصال کوالانسی CYN (یا متابولیت‌هایش) با DNA در موش بود (۱۰۲). از طرف دیگر نقش CYN در شکستگی رشته DNA نیز ثابت شده است (۱۰۳).

نتیجه‌گیری

توكسین‌های باکتریایی دارای ساختارهای شیمیایی و عملکردهای زیستی متنوعی می‌باشند. بیشتر این

- 6.Rossini GP, Hess P. Phycotoxins: chemistry, mechanisms of action and shellfish poisoning. EXS 2010; 100: 65-122.
- 7.Lubran MM. Bacterial toxins. Ann Clin Lab Sci 1988; 18: 58-71.
- 8.Madani F, Lindberg S, Langel U, et al. Mechanisms of cellular uptake of cell-penetrating peptides. J Biophys 2011; 2011: 414729.
- 9.Miaczynska M, Stenmark H. Mechanisms and functions of endocytosis. J Cell Biol 2008; 180: 7-11.
- 10.Valério E, Chaves S, Tenreiro R. Diversity and impact of prokaryotic toxins on aquatic environments: a review. Toxins (Basel) 2010; 2: 2359-410.
- 11.Pratheepa V, Vasconcelos V. Microbial diversity associated with tetrodotoxin production in marine organisms. Environ Toxicol Pharmacol 2013; 36: 1046-54.
- 12.Sousa ML. Occurrence of Tetrodotoxin Producing Bacteria on Marine Gastropods of the Northern Coast of Portugal [dissertation]. Porto: Institute Biomedical Sciences Abel Salazar University of Porto, 2011.
- 13.Do HK, Kogure K, Simidu U. Identification of deep-sea-sediment bacteria which produce tetrodotoxin. Appl Environ Microbiol 1990; 56: 1162-3.
- 14.Simidu U, Kita-Tsukamoto K, Yasumoto T, et al. Taxonomy of four marine bacterial strains that produce tetrodotoxin. Int J Syst Bacteriol 1990; 40: 331-6.
- 15.Do HK, Kogure K, Imada C, et al. Tetrodotoxin production of actinomycetes isolated from marine sediment. J Appl Bacteriol 1991; 70: 464-8.
- 16.Jensen PR, Fenical W. Strategies for the discovery of secondary metabolites from marine bacteria: ecological perspectives. Annu Rev Microbiol 1994; 48: 559-84.
- 17.Wei F, Ma T, Gong X, et al. Identification of tetrodotoxin-producing bacteria from goby *Yongeichthys criniger*. Toxicon 2015; 104: 46-51.
- 18.Saoudi M, Abdelmouleh A, El Feki A. Tetrodotoxin: a potent marine toxin. Toxin Reviews 2010; 29: 60-70.
- 19.Simidu U, Noguchi T, Hwang DF, et al. Marine bacteria which produce tetrodotoxin. Appl Environ Microbiol 1987; 53: 1714-5.
- 20.Wakely JF, Fuhrman GJ, Fuhrman FA, et al. The occurrence of tetrodotoxin (tarichatoxin) in amphibia and the distribution of the toxin in the organs of newts (taricha). Toxicon 1966; 3: 195-203.
- 21.Do HK, Hamasaki K, Ohwada K, et al. Presence of tetrodotoxin and tetrodotoxin-producing bacteria in freshwater sediments. Appl Environ Microbiol 1993; 59: 3934-7.
- 22.Lee MJ, Jeong DY, Kim WS, et al. A tetrodotoxin-producing *Vibrio* strain, LM-1, from the puffer fish *Fugu vermicularis radiatus*. Appl Environ Microbiol 2000; 66: 1698-701.
- 23.Wang XJ, Yu RC, Luo X, et al. Toxin-screening and identification of bacteria isolated from highly toxic marine gastropod *Nassarius semiplicatus*. Toxicon 2008; 52: 55-61.
- 24.Noguchi T, Hwang DF, Arakawa O, et al. *Vibrio alginolyticus*, a tetrodotoxin-producing bacterium, in the intestines of the fish *Fugu vermicularis vermicularis*. Marine Biol 1987; 94: 625-30.
- 25.Cheng CA, Hwang DF, Tsai YH, et al. Microflora and tetrodotoxin-producing bacteria in a gastropod, *Niotha clathrata*. Food Chem Toxicol 1995; 33: 929-34.
- 26.Sugita H, Ueda R, Noguchi T, et al. Identification of a Tetrodotoxin-producing Bacterium Isolated from the Xanthid Crab *Atergatis floridus*. Nippon Suisan Gakkaishi 1987; 53: 1693.
- 27.Campbell S, Harada RM, DeFelice SV, et al. Bacterial production of tetrodotoxin in the pufferfish *Arothron hispidus*. Nat Prod Res 2009; 23: 1630-40.
- 28.Yotsu M, Yamazaki T, Meguro Y, et al. Production of tetrodotoxin and its derivatives by *Pseudomonas* sp. isolated from the skin of a pufferfish. Toxicon 1987; 25: 225-8.
- 29.Yasumoto T, Yasumura D, Yotsu M, et al. Bacterial Production of Tetrodotoxin and Anhydrotetrodotoxin. Agr Biological Chem 1986; 50: 793-5.

- 30.Yan Q, Hoi-Fu Yu P, Li HZ. Detection of Tetrodotoxin and Bacterial Production by *Serratia Marcescens*. World J Microbiol Biotechnol 2005; 21: 1255-58.
- 31.Yu CF, Yu PH, Chan PL, et al. Two novel species of tetrodotoxin-producing bacteria isolated from toxic marine puffer fishes. Toxicon 2004; 44: 641-7.
- 32.Yu VC, Yu PH, Ho KC, et al. Isolation and identification of a new tetrodotoxin-producing bacterial species, *Raoultella terrigena*, from Hong Kong marine puffer fish *Takifugu niphobles*. Mar Drugs 2011; 9: 2384-96.
- 33.Yang G, Xu J, Liang S, et al. A novel TTX-producing *Aeromonas* isolated from the ovary of *Takifugu obscurus*. Toxicon 2010; 56: 324-9.
- 34.Maran BA, Iwamoto E, Okuda J, et al. Isolation and characterization of bacteria from the copepod *Pseudocaligus fugu* ectoparasitic on the panther puffer *Takifugu pardalis* with the emphasis on TTX. Toxicon 2007; 50: 779-90.
- 35.Matsui T, Taketsugu S, Kodama K, et al. Production of Tetrodotoxin by the Intestinal Bacteria of a Puffer Fish *Takifugu niphobles*. NIPPON SUISAN GAKKAISHI 1989; 55: 2199-2203.
- 36.Auawithoothij W, Noomhorm A. *Shewanella putrefaciens*, a major microbial species related to tetrodotoxin (TTX)-accumulation of puffer fish *Lagocephalus lunaris*. J Appl Microbiol 2012; 113: 459-65.
- 37.Hwang DF, Arakawa O, Saito T, et al. Tetrodotoxin-producing bacteria from the blue-ringed octopus *Octopus maculosus*. Marine Biol 1989; 100: 327-32.
- 38.Ritchie KB, Nagelkerken I, James S, et al. Environmental microbiology: A tetrodotoxin-producing marine pathogen. Nature 2000; 404: 354.
- 39.Chulanetra M, Sookrung N, Srimanote P, et al. Toxic marine puffer fish in Thailand seas and tetrodotoxin they contained. Toxins (Basel) 2011; 3: 1249-62.
- 40.Bragadeeswaran S, Therasa D, Prabhu K, et al. Biomedical and pharmacological potential of tetrodotoxin-producing bacteria isolated from marine pufferfish *Arothron hispidus* (Muller, 1841). J Venom Anim Toxins incl Trop Dis 2010; 16: 421-31.
- 41.Botana LM. Seafood and freshwater toxins: Pharmacology, physiology, and detection. 3rd ed. Florida: CRC Press, 2014, 20-1215.
- 42.Wu Z, Xie L, Xia G, et al. A new tetrodotoxin-producing actinomycete, *Nocardiopsis dassonvillei*, isolated from the ovaries of puffer fish *Fugu rubripes*. Toxicon 2005; 45: 851-9.
- 43.Wang J, Fan Y. Isolation and characterization of a *Bacillus* species capable of producing tetrodotoxin from the puffer fish *Fugu obscurus*. World J Microbiol Biotechnol 2010; 26: 1755-60.
- 44.Lu Y, Yi R. *Bacillus horikoshii*, a tetrodotoxin-producing bacterium isolated from the liver of puffer fish. Annals Microbiol 2009; 59: 453.
- 45.Wang J, Fan Y, Yao Z. Isolation of a *Lysinibacillus fusiformis* strain with tetrodotoxin-producing ability from puffer fish *Fugu obscurus* and the characterization of this strain. Toxicon 2010; 56: 640-3.
- 46.Nieto FR, Cobos EJ, Tejada MA, et al. Tetrodotoxin (TTX) as a Therapeutic Agent for Pain. Mar Drugs 2012; 10: 281-305.
- 47.Mattei C, Legros C. The voltage-gated sodium channel: a major target of marine neurotoxins. Toxicon 2014; 91: 84-95.
- 48.Chahine M, O'Leary ME. Regulatory role of voltage-gated Na channel β Subunits in sensory neurons. Front Pharmacol 2011; 21: 70.
- 49.Ulbricht W. Sodium channel inactivation: molecular determinants and modulation. Physiol Rev 2005; 85: 1271-301.
- 50.Ragsdale DS, McPhee JC, Scheuer T, et al. Common molecular determinants of local anesthetic, antiarrhythmic, and anticonvulsant block of voltage-gated Na⁺ channels. Proc Natl Acad Sci U S A 1996; 93: 9270-5.
- 51.Catterall WA, Cestèle S, Yarov-Yarovoy V, et al. Voltage-gated ion channels and gating modifier toxins. Toxicon 2007; 49: 124-41.
- 52.Catterall WA, Goldin AL, Waxman SG. International Union of Pharmacology. XLVII. Nomenclature and structure-function

- relationships of voltage-gated sodium channels. *Pharmacol Rev* 2005; 57: 397-409.
53. Black JA, Waxman SG. Sodium channels and microglial function. *Exp Neurol* 2012; 234: 302-15.
54. Waxman SG. Transcriptional channelopathies: an emerging class of disorders. *Nat Rev Neurosci* 2006; 2: 652-9.
55. Tetrodotoxin-WEX Pharmaceuticals. (Accessed December 01, 2015, at <http://adisinsight.springer.com/drugs/800016242>)
56. Kosuge T, Tsuji K, Hirai K, et al. First evidence of toxin production by bacteria in a marine organism. *Chem Pharm Bull (Tokyo)* 1985; 33: 3059-61.
57. Hayashi E, Isogai M, Kagawa Y, et al. Neosurugatoxin, a specific antagonist of nicotinic acetylcholine receptors. *J Neurochem* 1984; 42: 1491-4.
58. Seemann P, Gernert C, Schmitt S, et al. Detection of hemolytic bacteria from *Palythoa caribaeorum* (Cnidaria, Zoantharia) using a novel palytoxin-screening assay. *Antonie Van Leeuwenhoek* 2009; 96: 405-11.
59. Frolova GM, Kuznetsova TA, Mikhailov VV, et al. Immunoenzyme method for detecting microbial producers of palytoxin. *Bioorg Khim* 2000; 26: 315-20.
60. Bellocchi M, Sala GL, Prandi S. The cytolytic and cytotoxic activities of palytoxin. *Toxicon* 2011; 57: 449-59.
61. Rossini GP, Bigiani A. Palytoxin action on the Na⁺,K⁽⁺⁾-ATPase and the disruption of ion equilibria in biological systems. *Toxicon* 2011; 57: 429-39.
62. Wu CH. Palytoxin: membrane mechanisms of action. *Toxicon* 2009; 54: 1183-9.
63. Gadsby DC, Takeuchi A, Artigas P, et al. Peering into an ATPase ion pump with single-channel recordings. *Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci* 2009; 364: 229-38.
64. Pearson L, Mihali T, Moffitt M, et al. On the chemistry, toxicology and genetics of the cyanobacterial toxins, microcystin, nodularin, saxitoxin and cylindrospermopsin. *Mar Drugs* 2010; 8: 1650-80.
65. Herrero A, Flores E. The cyanobacteria: molecular biology, genomics and evolution. Norfolk: Caister Academic Press, 2008, 335-82.
66. Calteau A, Fewer DP, Latifi A, et al. Phylum-wide comparative genomics unravel the diversity of secondary metabolism in Cyanobacteria. *BMC Genomics* 2014; 15: 977.
67. Whittle K, Gallacher S. Marine toxins. *Br Med Bull* 2000; 56: 236-53.
68. Corbel S, Mougin C, Bouaïcha N. Cyanobacterial toxins: modes of actions, fate in aquatic and soil ecosystems, phytotoxicity and bioaccumulation in agricultural crops. *Chemosphere* 2014; 96: 1-15.
69. Banack SA, Johnson HE, Cheng R, et al. Production of the neurotoxin BMAA by a marine cyanobacterium. *Mar Drugs* 2007; 5, 180-96.
70. del Campo FF, Ouahid Y. Identification of microcystins from three collection strains of *Microcystis aeruginosa*. *Environ Pollut* 2010; 158, 2906-14.
71. Botana LM, James KJ, Crowley J, et al. Phycotoxins: Chemistry and Biochemistry. Hoboken: Blackwell Publishing, 2007, 65-122.
72. Aráoz R, Molgó J, Tandeau de Marsac R. Neurotoxic cyanobacterial toxins. *Toxicon* 2010; 56: 813-28.
73. Purves D, Augustine GJ, Fitzpatrick D, et al. Neuroscience. 5th ed. Massachusetts: Sinauer Associates, Inc., 2012, 115-28.
74. Osswald J, Rellan S, Gago A, et al. Toxicology and detection methods of the alkaloid neurotoxin produced by cyanobacteria, anatoxin-a. *Environ Int* 2007; 33: 1070-89.
75. Spivak CE, Witkop B, Albuquerque EX. Anatoxin-a: a novel, potent agonist at the nicotinic receptor. *Mol Pharmacol* 1980; 18: 384-94.
76. Lilleheil G, Andersen RA, Skulberg OM, et al. Effects of a homoanatoxin-a-containing extract from *Oscillatoria formosa* (Cyanophyceae/cyanobacteria) on neuromuscular transmission. *Toxicon* 1997; 35: 1275-89.
77. Mahmood NA, Carmichael WW. Anatoxin-a(s), an anticholinesterase from the

- cyanobacterium *Anabaena flos-aquae* NRC-525-17. *Toxicon* 1987; 25: 1221-7.
78. Cusick KD, Sayler GS. An Overview on the Marine Neurotoxin, Saxitoxin: Genetics, Molecular Targets, Methods of Detection and Ecological Functions. *Mar Drugs* 2013; 11: 991-1018.
79. Wang DZ, Zhang SF, Zhang Y, et al. Paralytic shellfish toxin biosynthesis in cyanobacteria and dinoflagellates: A molecular overview. *J Proteomics* 2016; 135: 132-40.
80. Mohebbi Gh, Nabipour I, Vazirizadeh A. Neurotoxic Syndromes in Marine Poisonings a Review. *Iran South Med J* 2014; 17: 451-75. (Persian)
81. Su Z, Sheets M, Ishida H, et al. Saxitoxin blocks L-Type ICa. *J Pharmacol Exp Ther* 2004; 308: 324-9.
82. Jablonski EM, Mattocks MA, Sokolov E, et al. Decreased aquaporin expression leads to increased resistance to apoptosis in hepatocellular carcinoma. *Cancer Lett* 2007; 250: 36-46.
83. Rush T, Liu X, Lobner D. Synergistic toxicity of the environmental neurotoxins methylmercury and β -N-methylamino-L-alanine. *Neuroreport* 2012; 23: 216-9.
84. Dunlop RA, Cox PA, Banack SA, et al. The non-protein amino acid BMAA is misincorporated into human proteins in place of L-serine causing protein misfolding and aggregation. *PLOS One* 2013; 8: e75376.
85. Berman FW, Gerwick WH, Murray TF. Antillatoxin and kalkitoxin, ichthyotoxins from the tropical cyanobacterium *Lyngbya majuscula*, induce distinct temporal patterns of NMDA receptor-mediated neurotoxicity. *Toxicon* 1999; 37: 1645-8.
86. LePage KT, Goeger D, Yokokawa F, et al. The neurotoxic lipopeptide kalkitoxin interacts with voltage-sensitive sodium channels in cerebellar granule neurons. *Toxicol Lett* 2005; 158: 133-9.
87. Li WI, Berman FW, Okino T, et al. Antillatoxin is a marine cyanobacterial toxin that potently activates voltage-gated sodium channels. *Proc Natl Acad Sci U S A* 2001; 98: 7599-604.
88. Inoue M. Chemical construction and structural permutation of neurotoxic natural product, antillatoxin: importance of the three-dimensional structure of the bulky side chain. *Proc Jpn Acad Ser B Phys Biol Sci* 2014; 90: 56-66.
89. Cao Z, Gerwick WH, Murray TF. Antillatoxin is a sodium channel activator that displays unique efficacy in heterologously expressed rNav1.2, rNav1.4 and rNav1.5 alpha subunits. *BMC Neurosci* 2010; 11: 154.
90. Berman FW, Gerwick WH, Murray TF. Antillatoxin and kalkitoxin, ichthyotoxins from the tropical cyanobacterium *Lyngbya majuscula*, induce distinct temporal patterns of NMDA receptor-mediated neurotoxicity. *Toxicon* 1999; 37: 1645-8.
91. Jabba SV, Prakash A, Dravid SM, et al. Antillatoxin, a novel lipopeptide, enhances neurite outgrowth in immature cerebrocortical neurons through activation of voltage-gated sodium channels. *J Pharmacol Exp Ther* 2010; 332: 698-709.
92. World Health Organization. Cyanobacterial toxins: microcystin-LR in drinking-water. Background document for preparation of WHO Guidelines for drinking-water quality. 2nd ed. Geneva: WHO, 2003, 407-8.
93. Fischer WJ, Altheimer S, Cattori V, et al. Organic anion transporting polypeptides expressed in liver and brain mediate uptake of microcystin. *Toxicol Appl Pharmacol* 2005; 203: 257-63.
94. Pereira SR, Vasconcelos VM, Antunes A. Computational study of the covalent bonding of microcystins to cysteine residues—a reaction involved in the inhibition of the PPP family of protein phosphatases. *FEBS J* 2013; 280: 674-80.
95. Valério E, Vasconcelos V, Campos A. New insights on the mode of action of microcystins in animal cells—a review. *Mini Rev Med Chem* 2016; 16: [Epub ahead of print].
96. Gehringer MM, Adler L, Roberts AA, et al. Nodularin, a cyanobacterial toxin, is synthesized in planta by symbiotic *Nostoc* sp. *ISME J* 2012; 6: 1834-47.
97. Froscio SM, Humpage AR, Wickramasinghe W, et al. Interaction of the cyanobacterial toxin

- cylindrospermopsin with the eukaryotic protein synthesis system. *Toxicon* 2008; 51: 191-8.
98. Byth S. Palm Island mystery disease. *Med J Australia* 1980; 2: 40-2.
99. Poniedziałek B, Rzymski P, Kokociński M. Cylindrospermopsin: water-linked potential threat to human health in Europe. *Environ Toxicol Pharmacol* 2012; 34: 651-60.
100. Terao K, Ohmori S, Igarashi K, et al. Electron microscopic studies on experimental poisoning in mice induced by cylindrospermopsin isolated from blue-green alga *Umezakia natans*. *Toxicon* 1994; 32: 833-43.
101. Froscio SM, Humpage AR, Burcham PC, et al. Cylindrospermopsin-induced protein synthesis inhibition and its dissociation from acute toxicity in mouse hepatocytes. *Environ Toxicol* 2003; 18: 243-51.
102. Shaw GR, Seawright AA, Moore MR, et al. Cylindrospermopsin, a cyanobacterial alkaloid: evaluation of its toxicologic activity. *Ther Drug Monit* 2000; 22: 89-92.
103. Shen X, Lam PK, Shaw GR, et al. Genotoxicity investigation of a cyanobacterial toxin, cylindrospermopsin. *Toxicon* 2002; 40: 1499-501.

Review Article

The most important marine bacterial toxins; a review

A. Najafi ^{1*}, I. Nabipour ¹

¹ The Persian Gulf Marine Biotechnology Research Center, The Persian Gulf Biomedical Sciences Research Institute, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran

(Received 30 May, 2016)

Accepted 20 Jun, 2016)

Abstract

Background: Bacterial toxins are toxic compounds which are produced in order to present microbial pathogenicity or to combat with the host immune system response. There is a cumulating evidence indicating bacterial origin for marine toxins such as tetrodotoxin, palytoxin, neosurugatoxin, etc. The most important marine toxins produced by different marine bacteria, their origin, structure and mechanisms of action were evaluated in a systematic review.

Materials & Methods: Marine bacteria, marine bacterial toxins, and their mechanisms of action and structure were keywords for a comprehensive search in online databases including Pubmed, Science Direct, Google Scholar and Scirus. A total of 120 papers were evaluated, however, by omitting similar reports, 103 papers were included in the study.

Results: The most of marine bacterial toxins are classified in one of the following groups: neurotoxins, hepatotoxins and cytotoxins. These toxins have distinct mechanisms of action including blocking of sodium channels in nerve cells, functioning as agonists of acetylcholine receptors, inhibiting of membrane pumps, the inhibition of protein phosphatases 1 and 2A types' enzyme activities and inhibiting of protein synthesis.

Conclusion: The clarification of the marine bacterial toxins structures and their mechanisms of action may be helpful for novel drug design, therapeutic measures and to overcome against bacterial pathogenicity.

Key words: Marine bacteria, Marine toxins, Marine toxicity, Marine toxinology

©Iran South Med J. All rights reserved.

Cite this article as: Najafi A, Nabipour I. The most important marine bacterial toxins; a review. . Iran South Med J 2016; 19(3): 482-510

Copyright © 2016 Najafi, et al. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.

* Address for correspondence: The Persian Gulf Marine Biotechnology Research Center, The Persian Gulf Biomedical Sciences Research Institute, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran. Email: akna85@gmail.com